



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.


About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

COUNTWAY LIBRARY



HC 2A6A E



2.2202

ADDIDAMENTA QUAEDAM

AD

VARIOLOIDIS VACCINICAE

NOTITIAM.

AUTORE

JULIO VALENT. TISCHENDORF

MEDIC. ET CHIRURG. DOCTORE.

SCHOENHOF & MOELLER:
40 WINTER ST.
BOSTON.

LIPSIÆ,

PROSTAT APUD C. H. RECLAM.

1829.

8781
P A T R I

**OPTIMO, OMNI PIETATE COLENDO,
DILECTISSIMO**

IOANNI CHRIST. TISCHENDORF

**DOCTORI MEDICINAE ET CHIRURGIAE
EXPERIENTISSIMO,**

1274

HAS

STUDIORUM PRIMITIAS

SACRAS ESSE

VOLUIT

FILIUS AUTOR.

Prooemium.

Quamvis permagnus scriptorum numerus diagnosin morborum variolis affinium, eorum naturam causamque eruere studuerint, equidem non inutile tamen opus suscipere mihi videbar in varioloidem vaccinica inquisiturus, cum viderem, sat multos adhuc exstare inter medicos, qui partim, quid de phaenomeno illo doceant, nesciant adhuc et

quaerant, partim irrideant illis, qui varioloidem pro singulari morbi specie describere conentur. Neque ego ita sum arrogans, ut mihi eventurum esse sperem, quod viri maxime eruditi frustra optarunt; eo minus tamen, quin varioloidem illam, quam inter Lipsienses et Variscos centies certe vidi obviam, iterum describerem, retinebar, cum contigisset mihi, ut virorum celeberrimorum, doctissimorum, omnique pietate colendorum observationibus et sententiis uti possem. Inde fortasse factum est, ut multa viderem rectius, facilius, quid de aliorum placitis esset sentiendum, intelligerem, et felicius, quid de re non plane perspicua judicandum, augurarer.

Ita Lipsiae Illustr. Clarus et Excell. Cerutti, Dresdae Illustr. Seiler, Illustr. Weigel et Excell. Choulant, (qui praeterea quoque me Dresdae per aliquot septimanas versantem exquisite ea ratione sublevabant, ut, quidcumque bibliothecae publicae et privatae ad materiam meam illustrandam continerent, maxima mecum communicarent humanitate) Plaviae Exper. de Seckendorf, Wildenfelsiae Illustr. Unger, Greitziae Illustr. Schaufuss, Auerbachiae Expp. Judersleben (pater et filius) magnopere de me commeruerunt; quorum virorum nominibus pro tot doctrinae, humanitatis et favoris indicis aeternae me addictum fore, publice promittendi fas est. Eximias autem gratias Tibi quo-

que ago, pater dilectissime, omni filii pietate reverende! multa Te monente et docente edoctus sum; ita ut triginta annis confirmata experientia Tua saepenumero tirocinio meo pro duce esset et face.

At enim vero liceat mihi in hoc prooemio aliquas mihi paranti oppositiones, quas plures mihi structuros esse jam praevideo; et respondentem ea, quae contra tales habeam in mente. Per magna sane pars exstat medicorum, qui contendere ament, varioloidem nostram neutiquam novi aliquid exhibere, potius esse variolae ipsius varietatem antiquis quoque temporibus observatam pluries. Confiteor, me ipsum prius tali sententiae mentem meam non denegasse, ratum, vacciolam prius insitam ex aliqua tantum par-

te prohibere, ne contagium variolosum tam vehementer afficiat organismum, at variolam tamen ipsam produci, forma parum deflectente, itaque comparatam, qualem Sydenham, Van Swieten, Burserius aliique pluries depinxerint, utpote e variorum momentorum connexu ortam et mitigatam quidem. At equidem et Sydenhami et Burserii et Van Swieteni, aliorumque, qui bene variolam denotasse laudantur, descriptiones non plane negligenter pervolvebam; neque negari potest: omnes fere in hac re consentire, variolam posse forma maxime diversa, et caractere modo hoc, modo alio notatam observari; nullibi autem exstat relatio accuratior de variola, ita quoad formam, cursum et characterem

composita, ut cum varioloide vaccinica jure possit comparari, vel adeo, illam cum hac unam eandemque esse, demonstrari. Variolois vaccinica revera novus est morbus, novusque sit necesse est; quoniam antequam vacciola insereretur, tale quid, quod contagii variolosi vim et naturam ita immutare et transformare valuerit, non adfuit. Vacciola superata esse nequit, nisi ita, ut variolae inficiendi facultatem aut plane tolleretur, aut valde certe imminueretur, et peculiariter diffunderetur. Sane multi vacciolam passi sunt; profanis scilicet manibus! cum homines quondam vacciolae insitioni incumberent, neutiquam ad hanc exercendam artem adaptati. Etenim levis est opera quidem, lympham

inserere brachio cuidam; effectus autem inde oriundus, quomodo computandus sit et dijudicandus, videre, non cujusque oculi profani esse potest.

Quare variolois vaccinica non dicatur exanthema variolosum illud, quod in homine, vacciolam modo aliquo, qualiscunque sit, passo observatur; qui potius, contagio varioloso expositus, ab infectione variolae verae, quae variis quidem momentis uti in omni, ita in hoc etiam homine, aliquantulum immutari potest et mitigari, securus esse nequit.

Quoad momenta varioloidem productia non plane iiscum consentire poteram, qui solum vitia in vacciolae insitione commissa accusant. Verum est

quidem, variis interdum causis oriri pro vacciola vaccinellam, quae satis prope quidem ad illius naturam et speciem accedens, contagii variolosi vehementiae quantum detrahat; cum si magis adeo recedat et localis solummodo sit, plane non organismum a variolis tueatur; at non minus verum est, quod alii interdum monuerunt, accuratius tamen docere dubitabant adhuc: exstare momenta quaedam, quibus fieret, ut vacciola, etiam satis regulariter superata, non penitus variolosi contagii vim delere posset. Ita persuasum mihi habeo, aetatem pari inferiorem atque scrophulosin insitioni subjectorum fuisse persaepe pro impedimento, quominus vacciola omnem explicare potuisset vim suam; deinde au-

tem epidemiae etiam vehementiam tantam interdum accepisse vim, ut homines, et vacciolam et variolam adeo passi, affici iterum possent; de quibus singulis capite pathogeniae addicto fusius mentem meam edere conatus sum.

Quae de materia mea scripta sint usque ad annum hujus saeculi XXVIII^m. colligere studui; ubi vero fortasse hujus et illius mentionem injicere oblitus sim, ab humanitate lectorum eo magis excusandus mihi videor, cum plurima fere, quae de varioloide cogitata sint et publici juris facta, sparsim in diariis et commentariis publicis legantur, quorum tanta est copia, ut omnia aegre possint perlustrari.

Accipias igitur, Lector benevole, libellum meum mancum, scio, et tenuem; in quo, si intelligas modo, me, ut aliqua ad varioloidis notitiam adderem, laborasse, jam satisfactum esse censuerim virium mearum levitati; indeque mihi evadere adhortationem, ut, quaecunque de materia illa experientia quondam doctura sit, pro studio mihi sumam et commendem singulari, atque meliora fortasse aliquando ut tradere possim, omnibus nervis allaborem. Vale.

CAPUT I. PARS HISTORICA.

Sect. I. Varioloidis historia; ex medicorum scriptis chronologice ordinatis.

1. *Wendelstaedt*, in: Sammlung medic. u. chir. Aufsätze, mit merkwürdigen pract. Fällen von W. Hadamar; 1807.
2. *Willan*, Ueber Kuhpockenimpfg. Uebers. und mit Zusätzen von *Mühry*. Göttingen 1808.
3. *Verhandelingen* van het Rotterdamsh Genootshop ter Bevoordering van de Koepockinenting, gehouden d. 9. Decbr. 1807. Rotterdam 1808.
4. *Mühry*, in Journal der pract. Arzneik. etc. von Hufeland und Osann. 1809. März.
5. Cf. *Stieglitz*, in: Neues Hannöverisch. Magazin etc. 97stes Stück d. 2. Dec. 1808, et *Heim*, in: Archiv für medic. Erfahrung etc. von Horn, Wagner und Nasse. 1809. VII, 2, p. 183 et *Stieglitz* in: Horns Archiv 1809. VIII, 2, p. 187 et *Mühry* iterum in Hufeland. Journ. 1810, Febr.
6. *Nolde*, Hufeland. Journ. 1810, Apr.
7. *Rave*, Hufeland. Journ. 1812; Aug. p. 98.
8. *Bremer*, in Horns Archiv. 1811. 1.
9. *Wesener*, die sämmtlichen Schutzpockenverhandlungen in meinem Physicatskreise. Hufeland. Journ. 1812. Aug. und Septbr.

10. Salzburger medic. chir. Zeitung, 1813. 4ter Band.
p. 265. (Geschichte der bisherigen Erfolge der
Schutzpockenimpfung etc. etc. von Berthollet, Percy
und Hallé.)
11. *John Adams*, Thesis de variola et vaccina. Edin-
burgh 1814.
12. *Hugo*, in Medical and physical Journal. London,
Decbr. 1814.
13. *Fosbrock*, in London medic. repository. Decbr.
1814 et Febr. 1815.
14. *Ring*, in Medic. repository. London March 1815.
15. *Walker*, ibidem Novbr. 1815.
16. *Albers*, Hufeland. Journ. Aug. 1815.
17. *Montesanto*, Considerazion medico-pratiche sul
vajuolo spurio o ravaglione. Padova 1816.
18. *Th. Harrison*, in Medical and phys. Journ. Lon-
don. Januar 1817.
19. *Henr. Dewar*, account of an epidemie Smallpox,
which occured in Cupar in Fife and the degree of
protecting influence of Vaccination etc. Cupar, 1817.
20. *Grace*, in epistola Duncani, vid. Edinburg Journ.
N. 51. Juli 1817.
21. *John Henzen*, an account of the eruptive diseases
which have lately appeared in the military hospitals
of Edinburg etc. communicated in a letter to Dr.
Duncan jr. Edinburg medic. and phys. Journ. N. 56.
Octobr. 1818.
22. *Alexdr. Monro*, Observations on the different
Kinds of Smallpox and especially of that, which so-
metimes follows Vaccination. Edinburgh 1818.
23. *John Thomson*, some observat. on the varioloid
disease which has lately prevailed in Edinburgh;
and on the identity of chickenpox and modified
Smallpox; in Edinburgh medic. and physic. Journal

- N. 56. Octobr. 1818; further observations; ibidem
N. 57. Novbr. 1818.
24. *Berard et de Lavit*, essai sur les anomalies de la Variole et de la Vaccine, avec l'histoire analytique de l'épidémie éruptive, qui a régné à Montpellier. Montp. 1818.
25. *Vougens* petite vérole chez plus de 200 individus vaccinés, observés au Millau en 1817. Rhodéz 1818. *Fontanelles*, description de la Varicelle, qui a régné épidémiquement et conjointement avec la Variole dans la ville de Millau en 1817. Montpellier 1818.
26. *Gysberti Hodenpyl*, Waarnemingen omtrent de thans heerschende Epidemie der Kinderpickte. Rotterdam 1818. vid. Hufeland. Journ. 1818. Novbr.
27. *Stiprian Luiscius*, De Waar de Koepok Inenting gehandhoofden op nieuw aanbevolen daar St. L. Delft 1818.
28. *Gaitskell* in London medical and phys. Journ. Decbr. 1818. cf. cum
29. *Pew*, ibidem Apr. 1819.
30. *Bent*, ibidem Jun. 1819.
31. *G. Colville*, in: Edinburgh Journ. N. 53. Jan. 1818.
32. *Alisson*. ibidem N. 55. et N. 59.
33. *Black*, ibidem N. 58 et
34. *Brown*, ibid. N. 58.
35. *Astbury*, ibid. N. 57.
36. *Barnes*, ibid. N. 59.
37. *Fosbrock*, in London medical repository Dec. 1818 et Septbr. 1819.
38. *Hanemann*, die Schutzkraft der Kuhpocken; nach James Moore, history and practice of vaccination, Hamburg 1819.
39. *Hoppe*, Dissert. de vi vaccinarum antiyariolosa.

- Havniae 1819. vid. Hufelands Bibliothek 1820. St. 11 und 12. p. 311.
40. *Kausch*, Memorabilien der Heilkunde, Staatsarzneiwissenschaft etc. Bd. 3. Züllichau 1819. p. 268 bis 314.
 41. *Nouveau Journal de Medicine* etc. Apr. 1819.
 42. *Hippocrates*, toogewyd vanden geheelen omvang van de Genëeskunde etc. door Sander en Wachter. 1819. IV. 2s Heft p. 97.
 43. *Ghirlanda*, in *Nuovi Commentari di Medici. et de Chir. da Brera, Ruggieri e Caldami*. Padova 1819. Sem. 2do.
 44. *Suenska Laekare*, Sällskapetets Handlingar II, 2, p. 67.
 45. *John Cross*, a history of the variolous epidemie, which occurred in Norwich in the Year 1819 and detstroged 530 individuals with an estimate of the protection afforded by Vaccination and a review of pastet present opinions upon chickenpox and modiefied smallpox London 1820.
 46. *Sir Gilbert Blane*, in medic. and chirurgical transactions of the medic. and chir. society London Vol. X.
 47. *Ashburner*, London medical repository N. 75. 1820.
 48. *Macleod and Harrison*, London medic. et physical Journ. Juli und August 1820.
 49. *De Carro*, in: Hufelands Journ. 1827. Juni.
 50. *Gölis*, in: Jahrb. d. Medicin d. östr. Staats. St. 6. 1.
 51. *Kausch*, in Hufelands Journ. 1820. Jun.
 52. *Elsaesser*, Beschreibung einer Menschenpocken-seuche in Würtemberg, in den Jahren 1814—1817. Stuttgart 1820.
 53. *Krause*, Die Schutzpockenimpfung in ihrer endlichen Entscheidung etc. Nürnberg 1820. p. 40 und p. 501 Anmerk.

54. *John Thomson*, An account of the varioloid epidemic, which has lately prevailed in Edinburgh and other parts of Scotland, with observations on the identity of chickenpox with modified Smallpox. In a letter to Sir J. M'Gregor. London 1820.
55. *Dewar and Dunning*, Edinburgh Journ. N. 60. 1821.
56. *Crane*, *ibid.* N. 62.
57. *Hill*, *ibid.* N. 67.
58. *Murray*, Edinb. Journ. N. 68.
59. *Gittermann*, in Hufelands Journ. Apr. 1821.
60. Rapport fait à la Société Royale de Médecine à Bordeaux au nom d'une commission chargée de faire des recherches sur les prétendues petites vérolés, survenues chez des individus, qui avoient eu la vraie vaccine. Bordeaux 1822.
61. *Horat. Jameson*, Accounton the Smallpox, which prevailed at Baltimore during the Winter 1821—22, in American recorder Vol. V. Apr. 1822. p. 224.
62. *Thom. Mitchell*, a candid inquiry into the present state of Vaccination. Vid. in American record. Vol. V. Apr. p. 257.
63. *Henry Marshall*, in Edinburgh Journ. N. 74. 1822.
64. *Astbury*, *ibid.* N. 76.
65. *Dennet*, *ibid.* N. 76.
66. *Reed*, *ibid.* Apr. 1822.
67. *Innes*, *ibid.* Juli 1822.
68. *John Forbes*, in: London medic. repository. Septbr. 1822.
69. *Will. Shearman*, *ibid.* Decbr. 1822. N. 108.
70. *John Thomson*, Historical Sketch of the Opinions entertained by medical Men respecting the Varieties and secondary occurrence of Smallpox with

Observations on the Nature and Extent of the Security afforded by Vaccination against attacks of that Disease: In a letter to Sir James M'Gregor. Edinburgh and London 1822.

71. *Oeltze*, Hufeland. Journ. Jan. 1822.

72. *Seiler*, *ibid.* Apr. 1822.

73. *Stelzig*, in: Beobachtungen und Abh. aus d. Gebiete der gesammt. pr. Heilk: von Oestr. Aerzten, III, 1823.

74. *Rusts* Magazin für d. ges. Heilkunde, XV, 1.

75. *Georg Gregory*, London medic. repos. August 1823. p. 176.

76. *cf. G. Gregory*, Medico-chirurgical Transactions XII, 2. et *Froriep's* Notizen N. 119. Jan. 1824 et

77. *Julius*, de varioloide Hamburgi observata; *ibidem*; continuatio *ibidem* N. 156; Aug. 1824.

78. *Tourtual*, in Hufelands Journ. d. pr. H. 1824. Octbr.

79. *Lüders, Ad. Fr.*, Versuch einer kritischen Geschichte der bei Vaccinirten beobachteten Menschenblattern nebst Untersuchungen über die Natur, die Ursachen und die Verhütung dieser Krankheit. Altona, 1824. (vid. hujus recensio. in *Rusts* Krit. Repertor. IV, p. 124. atque in Hufelands Biblioth. 1823. Jan. p. 43.

80. *Dr. Hering*, Auszug aus Physicatsberichten, das Jahr 1822 betreffend, i. d. Zeitschrift für Natur- und Heilkunde; herausgeg. von d. Prof. der chirurg. medicin. Academie in Dresden. Jahrg. 1824.

81. *Wendts* Beiträge zur Geschichte der Menschenpocken, Kuhpocken und modificirt. Menschenpocken; Kopenhagen 1824. (ejus recensio in Hufelands Bibliothek, Jan. 1825.)

82. *Cribler*, in Hufelands Journ. St. X. 1825, p. 103.

83. Transactions of the Association of Fellows and Licentiates of King's and Queens College of Physicians in Ireland. Dublin. Vol. II. 1824.
84. Ars-Beraettelse om Svenska Laekare Sallskapets Arbeten. Stockholm 1825. Octbr.
85. *Hinzé*, in Rusts Magazin f. d. ges. H. Bd. XXI. Heft 1.
86. *Rob. Venables*, in the London medic. and physie. Journ. Vol. LIII. 1825. Jun.
87. *T. M. Greenhaw*, an Estimate of the true, Value of Vaccination as a Security against Smallpox. London 1825.
88. *Fr. W. Rublack*, Die Kuhpocken und d. Menschenblattern. Mittheilungen aus dem Gebiete der Erfahrung. 1826.
89. *Stephan Mora*, in Annali universali di Medicina. Compilat dal Sign. D. Annib. Omodei. Mailand 1826. Jan.
90. Salzburgische medicin. chirurg. Zeitung. N. XXII. p. 377. Mart. 1826.
91. *Ravin*, in Gerson und Julius Magaz. d. ausl. Literatur. 1826, Heft IV.
92. *Robinson*, in Transactions of the Association of Fellows and Licent. etc. Vol. III. 1826. p. 105.
93. *Thom. Richards*, in The London medic. and physie. Journ. Jan. 1826.
94. *Rayer*, traité theorique et pratique des maladies de la peau, fondé sur de nouvelles recherches d'anatomie et de physiologie pathologiques. A Paris 1826, tom. I. p. 34. 2.
95. *Raimann*, Handbuch der speciellen medicinischen Pathologie und Therapie. Neue Aufl. Wien 1826. II. p. 111. §. 728.
96. *Meissner*, *Fr. Ludw.*, Was hat das neunzehnte Jahrhundert für die Erkenntniss und Heilung der

- Kinderkrankheiten gethan? Leipzig 1826. pag. 287.
97. *Möhl, Nic. Christ.*, De varioloidibus et varicellis Hafniae, Gyldenthal 1827. 8.
 98. *Moreau de Jonnes*, in Bulletin des sciences medicales Decbr. 1826; et in Harless Neuen Jahrbüchern der deutschen Medicin. Supplementband 1827. p. 102 — 113. Das ansteckende Varioloid, als eine neue vom Orient eingef. Blatternart. cf. Hufeland. Journ. 1827. Jan.
 99. *Guillou* in Nouvelle bibliothèque medicale Janv. 1826. et in Frorieps Notizen 1827. XVI. 22, N. 331.
 100. *Morton*, in London medic. and physic. Journal. Bd. 57. p. 408. et in Gerson und Julius Magaz. für ausl. Litterat, 1827. Juli.
 101. *Dr. Hering*, Zweiter Auszug aus Physicatsberichten, das Jahr 1823 betreffend, in der Zeitschr. f. Natur-und Heilkunde; herausgeg. von den Prof. d. Dresdner Academie, 1827.
 102. *Seiler*, in Hufelands Journ. 1827. p. 21—29.
 103. *Hofrichter*, in Horns Archiv für medicin. Erfahrung etc. 1827. p. 625—636.
 104. *Maler*, in Annalen f. die ges. Heilk. unter der Redaction d. Mitgl. d. Grossherz. Bad. Sanitätscommiss. IIIr Jahrg. 1s Heft. Karlsruhe 1827.
 105. *Pieper*, in Harless neuen Jahrb. der deutschen Medicin und Chir. 1827. Monat Jun.
 106. *Seulen*, in Horns Archiv etc. 1827. Septbr.
 107. *Jahn*, (Diagnostik der Blatterkrankheiten,) in Horns Archiv 1827. Novbr.
 108. *Willeverssch*, in Pierers Ann. d. 19ten Jahrb. 1827. Novbr.
 109. *Thulesius*, variolar. quae Halae floruerunt, descriptio Diss. in. Halae 1827.

CAPITIS I. SECT. SECUNDA.

Morbi historiae quaedam ex propria observatione.

§. 1.

CHRISTIANA K. Lipsiensis, puella annorum XVII, gracilis, cicatricibus vacciolae, quam primo vitae anno publice inseri passa est, satis perspicue notata, fluxum menstruorum, nondum adhuc regularem, ante aliquot menses acquisierat; cujus vestigia eo tempore, quo aegrotare coepit, cum vix comparuissent, penitus iterum evanuerunt. Postquam per plures dies de artuum gravitate, vomitione et somnilentia querula fuerat, fortior nunc exarsit febris cum capitis dolore, satis vehemente, affectione catarrhali urgente, et vomitu; quos prodromos, tertio post febris exacerbationem die, secutum est exanthema; maculaeque rubrae observatae primum in brachiis, mox etiam e facie tumida emergerunt; propullulare sequente die vesiculae, febris nulla fuit, dolor tamen colli crevit. Parentes, qui variolam, tunc temporis Lipsiae grassantem multosque interimentem, metuebant, nunc medici auxilium optabant; quare, cum ab Exc. Cerutti, regionis, quam habitabant, medico pauperibus ad-

dicto, praestandum esset illud, ego me ad curam suscipiendam accinxi, inter ejus discipulos tunc versatus. Vidi, ubi accessi (V^{to} morbi totius, II^{do} exanthematis progressi die) vesiculas lentis magnitudine, purpureo halone cinctas, pellucas hic, fluido seroso plenas, illic turbidiores, flavescentes, totum corpus aequali fere copia obsidentes, alias sub digito imposito molles, facili opera comprimendas, alias easque plures duriusculas, resistentes, quae, quamvis ipsarum copia haud exigua erat, confluerunt tamen nullibi. Febrem desideravi. Querebatur autem aegrotā de dolore laryngis regionem comburente, ciborum, potissimum solidorum deglutione adaucto, et leviori tussi. Ceterum adfuit anorexia, lingua muco oblecta, alvi tarditas, salivae frequens excretio, urina jumentosa.

Ordinavi emulsionem amygdalinam, clyisma, dietam tenuem.

Eruptionis die III^o. Pustulae pleniores sese ostendunt, partim pellucas hodie etiam, partim vero turbidas, flavescentes; ut plurimum pisi minoris magnitudine, planas, hic illic umbilico depressas; inter reliquas autem aliae, recentes, proveniant solitariae; dolor arteriae asperae, laryngis et faucium inflammatorius multum est adauctus, vox rauca, tenuis, dolorosa; salivatio sat copiosa; sitis fortior; febris parum excitata; odor peculiaris, non variolosus, similis tamen.

Regioni circa laryngem impositae sunt hiru-
dines octo; ordinatum infusum Malvae et flor.

Sambuci cum lacte pro potu; emulsio amygdalina repetita.

Die IV^{to} Pustularum faciem obsidentium plurimae in crustas colore succineo tinctas abire coeperunt; inter medias autem illas vesiculae minores singulae sese ostendunt serosas adhuc; aliis in corporis partibus pustulae majorem acquisierunt ambitum, tensivumque creant dolorem; aliae collapsae sunt; salivatio evanuit; ita etiam angina; atque omnis puellae status sat hilarem offert faciem.

Die V^{to}. Omnes pustulae, quarum multas aegrota ipsa ob dolorem tensivum me suadente aperuit forvice, aut crustulas succineo-fuscas formarunt, sub quibus cutis in conum elevata est, aut collapsae sunt et exsiccatae; plures etiam recentioris ortus hic sine ullo vestigio retro cesserunt, illic papularum instar prominent. Appetitus ciborum rediturus est; omniaque bene audiunt.

Die VII^{mo}. Crustae plurimae, fusci coloris, aridae, tenues, sine molestia decarpi possunt; cutis autem, ipsis obiecta, conspicitur in conum advecta, verruciformis, profunde rubra, non dolens; sub aliarum pustularum crustulis leves impressae sunt cicatrices laete rubentes; alibi epidermis in squamulas findi videtur. Aegrota extra lectum semel jam versata, satis bene se habebat; lipothymia nimirum, qua aëris flatui vehementiori fortasse exposita, extemplo rapta erat, mox illam deseruit, neque somnum ejus turbavit.

Ab hoc inde tempore melius quotidie aegrota sese habebat; at copi carnei illi et cicatrices, aëre

hiberno adflante statim lactum induentes ruborem, per plures restabant septimanas, donec sensim pristinam iterum cutis nacta est superficiem; si exceperis impressiones hic et illic conspiciendas laeves, albicantes, punctulis carentes, quas post quinque etiam conspexi menses.

§. 2.

Theone B., Lengenfeldensis, constitutionis gracilis, validae tamen, XXI annos nata, cui primum vitae annum agenti pater meus vacciolam regulari penitus successu inseruerat, die XVIII^{mo}. Apr. correpta est febre cum cephalalgia urgente, vomitione et gasteralgia. Cum vomitus, si quis proveniebat, levaminis paulum afferret, emeticum porrectum est, quod largam producendo emesin vomitionem mitigavit, febrem tamen atque cephalalgiam non sustulit. Sub vesperam diei tertii satis turgente in cute papulae provenere, paucae tamen, ita ut in facie una solummodo adesset; quo facto febris decrevit, sitis tamen cum inquietudine et anxietate, (adaucta fortasse metu, ne variola, quae tunc temporis plures inter Variscos affecit, paucos adeo orco dedit, proveniat) urgebat porro etiam aegrotam.

Die XXI^{mo} Apr. Noduli rubicundi caput attollunt, basin ampliant, protrudunt vesiculas, albicantes, lymphæ pellucida distentas. Reliquus status satis bonus est; nox blandam obtulit quietem, febremque penitus removit; appetitus tamen jacet

adhuc, alvus tarda est. Exhibetur pulvis e cremore tartari et rad. Rhei.

Die XXII^o. Apr. Vesiculae, pisi minoris magnitudine, umbilicatae, halone lacte rubente cinctae, turbidiores, pruritus cutis, quae detumuit jam et blande sudat, provocant; reliquus status est exoptatus.

Die XXIV^{to}. Pustulae, quarum aliae dehiscunt, aliae valde solummodo extensae sunt, in crustas abiturae cernuntur; aegrotata, quae praeter debilitatem aliquam viriumque defectum nihil, quod queratur, habet, horas aliquot extra lectum sine ulla noxa agit.

Die XXVI^{to}. Omnes pustulae jam crustas ostendunt fuscas, sub quibus cutis, parum elevata, purpureo colore tincta est; totam per diem lectum spernit, comedit cibos cum appetitu; atque vires se recuperare jam bene sentit.

Vestigia exanthematis per aliquot septimanas ita restabant, ut tubercula satis parva aëris adflatu profunde rubentia emerent e cute; cicatrices nullibi conspiciebantur.

§. 3.

Eduardus B., (frater illius puellae) annorum XXIII, constitutionis validae, altae staturae, temperamento sanguinico, correptus est d. XIX^o. m. Apr. capitis dolore vehemente, horrore cum ardore volatili alternante, somno turbato, vomitione exigua, siti; quae symptomata nobis ad curam sorori praestandam antea jam praesentibus in-

dicabant instare exanthema. Congestiones sanguinis ad caput manantis ad tantam vehementiam accesserunt, ut per totam noctem aegrotus phantasmatis vexaretur. Tertio demum die punctula rubra, nodosa proruperunt, febremque penitus solverunt; congestiones tamen ad caput, quod turgere et tumere coepit, restabant; neque somnus carebat phantasmatis. Exhibita est potio nitrosa, et commendata diaeta antiphlogistica.

Die XXII^o m. Apr. Papulae, quae pridie propullulayerunt, et satis magna copia obtegunt corpus, ampliant basin, adollescunt, et fluido serosolymphatico complentur; capitis valde tumentis dolor mitior quidem, nondum tamen fugatus; alvi tarditas; anorexia exigua, lingua vix impura; febris nulla. Pulvis ordinatur leniter laxans.

Die XXIII^o. Pustulae pisiformes, umbilico hic et illic notatae, turbidae, flavescentes in eo jam esse videntur, ut crustas proxime conforment; facies adhuc valde tumet, praecipue nasus, haud exigua pustularum obtectus copia, isque ob tensionem et prurientem dolorem non parum vexat aegrotum; cephalalgiae, quam sedes large positae statim mitigarunt, vix vestigium. Odor peculiaris, isque optime cognoscendus, ubi stragula tollebam, et in cruribus plures pustulas, quae lympham condensatam mittebant, acu aperui.

Die XXIV^{to}. Plures pustularum, praecipue earum, quibus facies obsita est, in crustas jam transformatae sunt coloris succinei, basi coniformi, carnea, purpurea; aliae, paucae tamen, exsiccatae

sunt. Reliquus status nihil morborum ostendit; appetitus fortis est.

Die XXVI^o. Crustae ubicunque sunt excultae, levius inhaerentes, fuscae; sub quibus prominet cutis in conum elevata, carnea, profunde rubens, vari instar; facies nunc demum penitus detumuit; nasique dolor evanuit; in aliquorum conorum carneorum apice crustarum loco cernuntur squamulae, quae sensim decidunt.

Excrescentiae illae cutaneae per aliquot menses restabant perspicuae; deinde vero omne earum vestigium evanuit.

§. 4.

Carolina H., puella annorum XVIII, constitutionis gracilioris, sat. validae tamen, insitionem vacciolae ante primum vitae annum per patrem meum passa regulari effectum, correpta est sub diem X^m. Maj. mens. praevia totius corporis lassitudine, cephalalgia graviore, horripilatione atque intercurrente fervore, siti effreni et vomitione. Cum aegrotata penitus negaret, se cum quodam homine variolis affecto versatam esse, et verisimilius esset, malam dietam sordes procreasse, traditum illi est emeticum; at morbus larga emesi non e medio sublatus est, quin potius pro symptomate anginam sibi junxit catarrhalem et vehementiorem cum febris gradu pergebat. Sub diei tertii vesperam totius corporis cutis, et primum quidem faciei, brachiorum et pectoris, punctulis rubris obsita est; unde cum per noctem largiore etiam copia prorupissent,

febre penitus fugata non exiguum evenit levamen; angina tamen cum leviori cephalalgia restitit. Hac de causa, praecipue tamen ob metum, ne contra spem variolae instarent filiae, me arcessiverunt parentes. Die XIV. m. Maj. ad aegrotae lectum profectus varioloides vaccinicas futuras esse consolatus sum; vesiculae jam emergerunt e maculis sero pellucido plenae, sat copiosae, halone lacte rubro cinctae; cutis omnis turgebat leniterque sudabat; anginae gradus mitis nil nisi diaetam antiphlogisticam, et infusum malvae cum lacte et melle pro potu et gargarismate postulavit; appetitus parum fuit turbatus, lingua muco albo obducta, alvus regulariter posita.

Die XVI. m. Maj. post meridiem pustulae seri colorem immutarunt ex albo-pellucido in turbidum succineo-flavescentem; praecipue superiores in facie, quae in eo jam videntur, ut siccescant brevi; hinc inde tamen recentes vesiculae conspiciuntur. Odorem peculiarem non desideravi, praesertim cum, ut aliquot in cruribus umbilico notatas aperirem pustulas, stragula tollebam. Plurimae autem, quas acu dissecui pustulae, statim et uno facto vulnere fluidum fuderunt suum, quando minores erant; aegre tamen, neque nisi pluries lacsae, si pisorum magnitudinem vel adaequabant vel etiam superabant. Reliqua symptomata cuncta aut penitus evanuerunt, aut eorum vestigia solummodo restabant.

Die XVIII^o m. Maj. Plurimae pustularum crustas succineo - fuscas iuduerunt aridas, basi

coniformi carnea purpureo colore tinctae superse-
dentes; aliquae minorum et recentium pustularum
exsiccatae sunt sine ullo^a praeterea vestigio; aegri-
tudinis sensus non amplius aegrotam premebat;
commutavit post duos dies ipsa lecti ardorem cum
vernae atmosphaerae tepore. Tubercula vero, quae
crustis aridis, fuscis delapsis cutem tegebant, varos
adaequantia, post octo etiam septimanas conspexi.

§. 5.

At nunc non plane cassum videtur mihi opus
esse, cum varioloidis vaccinicae decursu comparare
illum variolae; quarum utriusque historiam ex dia-
rio meo exhibere eo minus dubito, quod in uno
conclavi, uno eodemque tempore altera soror, vac-
ciolae effectum desiderato, variolis; altera, vacciolae
satis regulariter ingredientis auxilio, varioloidibus
corripiebatur.

Perceperunt autem sorores hae contagium
variolosum a fratre quindecennario, qui ex ad-
spectu puellae, variolarum confluentium ex septima-
nis quatuor plane superatarum cicatricibus male
notatae horrore percussus atque tres post dies fe-
bre variolis praecursoria afflictus est; vidi ego ho-
minem variola perbenigna laborantem sub vespere
diei post eruptionem exanthematis quarti; atque
proximo sorores, quibus vacciolae insererentur, in
domicilium paternum adduci jussi.

B

Variola.

Christiana Aug. S. Grūnae nata (pagi prope Lengenfeldam) annorum novem, valida; d. XXV m. Jun. lymphā vaccini-
ca recenti vulneribus sex imbuta, septimo post in-
sitionem die, quo aggres-
sus sum ad ipsam, ullius
vulneris effectum exop-
tatum non ostendit; u-
num solummodo alte-
rumve vulnusculum in
nodulum sese excolue-
rat, ita tamen, ut pu-
stulas esse prodituras
plane non indicarent.
Valetudinem in nulla re
turbatam esse, asserenti
matri non potui quin op-
ponerem, et oculos filio-
lae turbidos, et faciei
colorem magis quam an-
tea lutescentem.

D. III. m. Jul. video
puellam febre vehemente
afflictam, caput ipsius,
de cujus dolore acerbo
non parum conqueritur,

Variolois vaccinica.

Christiana Caro-
lina S. soror, XI annos
nata, valida; eadem die
eademque lymphā im-
buta, primis diebus vesti-
gii nihil in brachiis ob-
tulit; quinto denu-
die nodulus procrevit;
ex eoque pustula d. 1^o
m. Julii emersit; eam
tamen exilem esse mater
retulit, cum puella per
pagum vaga demonstrari
mihi non posset.

D. III. m. Julii iterum
mihi aggresso relatum
est, puellam cibos qui-
dem paeterlapso die as-
sumsisse, non tamen
cum appetitu regulari;
et lassitudine pressam
conclave praeter consue-
tudinem praetulis-
se coe-
lo; sub vesperam vo-
muisse et de alvo dolente
querulam fuisse; noctem
peregisse inquiete, mul-
ta siti vexatam. Habet
febrem satis fortem, si-

Variola.

tumidum, oculorum conjunctivam inflammata, sitim ardentem; alvus hodie adhuc dolet, minus tamen, quam praeterlapso die, quo cibos denegavit, vomuit, alvum deiecit, lassitudinem per magnam et corporis totius dolores tensivos, rheumatismum simulant, querebatur. Neque colli, neque pectoris regio dolet, tussisque abest. In cute, quae ubique valde calida et tumida est, permulta punctula, perquam parva et nonnisi accuratissime inspecta conspicienda, sese ostendunt, profunde, uti pulicum morsus, qui annulo inflammato carent, rubentia.

Jussi diaetam antiphlogisticam exhiberi, caloremque, quantum possit moderari.

Variolois.

sim non exiguam, dolores colicos, cephalicos, oculorum; anginam catarrhalem, tussiculam et pruritum cutis; in qua hic et illic maculae laete rubentes videre erant. Ceterum vacciolae provenerant sex, quae formam et speciem penitus regularem ostendebant, si exceperis, quod inflammationis periphericae vestigium nunc, IX^o post insitionem die leve solum sese ostendebat.

Ordinata est diaeta apta et pro potu aqua, interposito decocto radie. Althaeae cum melle et lacte.

D. IV. m. Julii s. v. Noduli sese excoluerunt in cute, rubore laeto tincti, duriusculi, punctulis albescentibus notati; eorum copia non magna est; febris nondum pe-

Variola.

D. IV^{to} m. Julii sub vesperam. Punctula accreverunt et duriusculum acceperunt fundum, medio parum elevatum; cutis omnis maxime turget et calore urgente pungitur; febris cum omnibus, quaecunque ad ipsam pertinent, persistit adhuc; paulo mitior tamen dici potest. Per noctem vero aegrotæ semper sese huc et illuc revolvebat somniis et siti excruciatæ.

Die V^{to} m. Jul. In nodulorum, qui nunc e punctulis ubique ascenderunt apice, albicat epidermis pauxillum elevata, præcipue in facie, minus in corporis reliquis partibus, quæ tamen cunctæ nodulis obrutæ jam, se coherentes mox variolas laturas esse indicant. Cavum oris variolis penitus caret; statum aegrotæ jam me-

Variolois.

nitus fugata, mitior tamen cernitur; ita angina etiam nec minus sitis; appetitus desideratur quidem adhuc, vomituriatio tamen evanuit; alvus tarda est.

Ordinavi clyσμα. Ceterum pustulae vaccinicae, quas margo regulari paulo angustior in basi laete purpurea cingit, ambitum suum valde auxerunt, lymphæ impletae penitus fere lucida. Aegrotæ præterea queritur de glandularum axillarium dolore.

D. V^{to} m. Jul. E nodulis rubicundis emergerunt vesiculæ, quæ acule perforatae lymphæ pauxillum pellucidae, aquosae evomunt; in facie plures jam magnitudine provectæ sunt; totum vero supra corpus exanthema floret; febris abest, sitis mitigata, somnus quietus, appetitus cibo-

Variola,

liorem evadere ipsa confitetur; febris mitigata, sitis moderata.

D. VI. m. Jul. Variolae, quarum maxima copia corpus obruit, attolluntur, basin dilataverunt, implentur lymphapellucida; impressio umbilicalis nullibi desideratur; cuti omni turgente palpebrae mox oculos claudere minantur; febris vix vestigium; calor regularis; sitis exigua; lingua satis pura; appetitus ciborum rediturus; alvus regulariter posita. Ceterum nunc neque odoris specifici, neque ptyalismiadest vestigium. Cum omnia a natura recte peragantur, nilque sit, quod securiore tramite et rectiore sit trahendum, ab artis auxilio plane abstinui, aptam jussisse dietam contentus.

D. VII^m. Jul. Pustu-

Variolois.

rum redit; aegritudinis sensus vix ullus.

Vacciolae paulo perfectiorem acquisierunt inflammata areolam; mollior tamen regulari sentitur margo; lymphaturbida evasit.

D. VI. J. Vesiculae ad lentis magnitudinem accreverunt; sunt tamen etiam hic et illic noduli sine vesiculis; halonis rubor in luteam speciem abire videtur; lymphai ipsis contenta pellucet adhuc; in apice vesicularum quarundam invenitur punctulum nigrescens. Status omnis exoptatus est, ita ut puella extra lectum possit versari.

D. VII. m. Jul. Ubique florent pustulae umbilico ut plurimum leviores notatae; quae primum ortae erant, jam colorem succineum in-

Variola.

lae ad pisi magnitudinem ascenderunt, praecipue in facie, minus in artubus excultae sunt. Est tamen omnium magnitudo aequalis; quum potius inter reliquas singulae sint intermediae minores, acuminatae, varicellis non plane absimiles; halones variolarum ampliores jam corpus totum tinxerunt rubore. Acu perforatae variolae fundunt claram quidem, sed inter digitos haerentem et glutinosam lympham. Reliquus status sat bonus est, illas si exceperis molestias, quae ex tensione cutis efflatae, prurientis, hic et illic movendo, et incubando scissae, omnibus, qui variolis laborant, necessario redundant.

D. X. Variolarum color ex albo jam in lute-

Variolois.

duere incipiunt, halone duriusculo circumdatae; sunt tamen et hic recentes vesiculae parvae, varicellas adaequantes. Acu scissae edunt lympham lutescentem, aquosam, quam tamen flocculi albidii, caseosi pernatant.

D. X^{mo} m. Jul. (VIII et IX itinere impeditus sum, quin adirem) puella ad aegrotae lectum sororis sedens, famulatur illi et perbene sese habere fatetur; pustularum plurimae faciem obsidentium exsicari coeperunt et crustas succineas ostendunt; in brachiis tamen aliisque linteis obtectis partibus laete adhuc florent.

Ut paulo accuratius pustulae structuram exquirerem, scalpello pustulae regionem mediam circumcidi, ita ut in tenui solum stria teg-

Variola.

scentem transit; umbilicus in plurimis e medio sublatus est; halo roseus; calor ardens; post noctes plures quiete transactas antecedens perquam fuit turbata; pulsus vividius et agitatius micans exardescere febrem loquitur, item sitis adaucta et caput dolorosum. Omnes variolae, quas acu scissas plane vacuas antea reddideram, impletæ iterum inveniuntur, vulnuscule per crustulam clauso; singulae in facie dehiscunt pusque exsulant.

Eodem modo, quo in sorore, in hac etiam cultro circumcidi plures variolas; atque nihil fere inveni discriminis, nisi quoad contentum pustulae, quod hic densius, granulis mixtum, mellis condensati consistentiam adaequans, penitus ad naturam puris accessit;

Variolæ.

mentum superius adhaereret; effluxit omnis humor contentus praeter eum, qui in pustulae annulo exteriori latebat; oculo etiam armato nihil conspexi nisi fundum foveae pustulae cellularem, ex quo sudabat lymphæ lactea, aequalis, mellis tenuioris consistentia. Quas acu prius laeseram pustulas, collapsae plane sunt, et crustulis tenuibus superstratae; ceterum omnium pustularum basis coniformis, tuberculosa, livido-purpurea.

Pustulae vaccinicae crustis sunt tectae atrofuscis, marginemque habent purpureo colore tinctum, tenuem; e pustulis duabus decerptae sunt crustae, sub quibus fundus purulenta materia tectus cernitur.

Ubi post triduum aggressus sum, puellam,

Variola.

odor, qui ex pustulis cultro apertis ad nares advolabat, idem fuit, qualem semper e variolis veris percepi, quamvis longe mitior esse (nescio ob meam ipsius affectionem catarrhalem, an ob morbi lenitatem) visus mihi est.

D. XIV. Crustae e variolis ortae, faciem et trunci plures partes tegentes, obfuscatae sunt et scabrae; singulae autem in artubus albido nunc etiam pure nitent, aliae dehiscunt. Valitudo reliqua satis exoptata; et majorem debilitatem fore ut optimus appetitus et ciborum concoctio regularis penitus tollat, spes est.

Variolois.

quae in machina ad fila trahenda rotas volvere dicebatur, non vidi. Penitus bene valere istam, crustas decidisse omnes fere, atque sub illis cutem cerni elevatam, varos quasi rubentes, mater mihi retulit.

Cicatricum comparisonem institui post septimanas octo; ipsasque praebeuit perfectas puella, quae variolas superaverat: subrotundas concavas, marginibus cinctas duriusculis, hic et illic scissis; in fundo punctula habentes nigrescentia, purpureo

rubentes colore; ubi confluerant variolae, quod in aliquot partibus habuerat locum, impressiones singulae nectebantur striis. Multo minus perspicua frater, a quo contagium hauserant sorores, gerebat vestigia: nimirum in plurimis locis maculas solum rubiginosas, parum supra cutem elevatas; alibi leves impressiones vix puncti latitudine; striis illis, cum variolae nusquam corporis confluiscent, penitus caruit. Soror postremo illa, quae varioloidibus affecta erat, tuberculosas ut plurimum obtulit excrescentias pro cicatricibus, hic et illic apice impresso, vix reliqua cute rubicundiores; vacciolarum cicatrices penitus mihi visae sunt regulares: rotundae, fundo concavo, nunc adhuc rubente, punctulis nigrescentibus notato, margine duriusculo.

§. 6.

Pauca solum habeo hisce relationibus, quas e centum fere observationibus ita elegi, ut et minutissimum sub §. 2 et satis vehementem sub §. 1. depingerem, addenda. Quod ad §. 1. attinet, dubitari non potest, quin morbus multum vehementiae suae mēstruorum periodo debuerit provenientium et dein turbatorum; quibus non nervi solum sensibilitate instructi majore avidius quasi morborum semina arripuerint, sed omnia quoque organa ob sanguinem in corpore restantem, turgore venoso obruta sint. Inde salivatio, inde vehemens anginae gradus. Ceterum mira observanda est mixtio pustularum et vesicularum, quarum priores propius ad

formam et naturam variolae accedentes, tubercula illa peculiaria, varioloidem, ubi sequuntur, vere significantia; hae vero varicellas paene adaequantes, aquosas vel suillas, reliquerunt cicatrices exiguas, — illis, quae variolam sequi solent, plane absimiles. Mitissimus revera gradus dici potest ille, quo variolis in casu sub §. 2. depicto ingressa est; a varicella tamen praecipue tuberculosa excrescentia, quae secuta est exanthema, discrepat. Saepissime observavi ita morbum conformatum, uti sub §. 5. delineare illum studui; a nullo autem, eorum certe, quos de hac re consului, accurate descriptam lego historiam morbi, casu ita oblatis et exculti, uti mihi contigit.

At transeundum nunc est ad materiae meae caput secundum, quo, quaecunque ad nosologiam pertineant, comprehendam; ita ut sectione prima explicem, quibusnam omnino variolois elata sit symptomatibus; secunda, qua serie morborum morbus noster sit collocandus, et quo nomine insigniendus, et tertia demum, qua ratione oriatur et quid pro causa accusandum?

CAPUT II.

NOSOLOGIA VARIOLOIDIS.

Sect. I. Symptomatologia et diagnosis.

§. 1.

Characterem varioloidis externum delineaturo mihi multo satius visum est meas ipsius ut plurimum sequi observationes, quam aliorum vestigia premere; cum, nisi fallor, sufficiente certe de hac re gaudeam experientia; aliquae partim non raro varicellarum historiam cum illa varioloidum commiscuerint, itaque aut perversam aut turbidam composuerint imaginem; partim penitus mecum consentiant. Sunt autem varioloidis stadia quinque: *infectionis, febris, papulae, pustulae, crustae*; quorum singula paucis jam perlustremus.

§. 2.

Per quantum temporis spatium *latere* possit in corpore, in quod irrepserit, contagium, donec reagat organismus in illud, certo quidem dici nequit; at non valde a vero aberrare videntur illi, qui contendunt: posse quinque et quatuordecim adeo dies ita tacere quasi. Vidi ego pluries morositatem aliquam, coenaestheseos alienationem,

dyspepsiam levem, aliaque per aliquot dies et per septimanam praecurrere, donec *febris* demum exarderet.

§. 5.

Ipsa autem quoad gradum et formam multifaria est, et diversa; quae nunc procellae instar grassatur, organismique vitam radicitus evertere velle videtur, nunc levissima est functionesque vitales vix deflectit tramite sueto. Hic horrorem percellentem sequitur ardor aestuans cum insomnio, siti effreni, cephalalgia urgente, delirio, convulsionibus, gasteralgia, vomitu bilioso, alvi dejectione; quae symptomata sensim crescentia sub tertiam diem plerumque pariunt maculas rubras in cute tumida et rubente; exanthematis principia, interdum non ita comparata, ut respondeant tantae praeparationi, saepe etiam talia, quae omnem cutem rubore suffundunt, et ne vehementissima proveniatur sit variola, metum injiciunt. At praecedit etiam e contrario levis tantum horripilatio, quam calor excipit modicus, dolor capitis, pulsus paulo fortius et agitatius micans, sitis exigua, vomitunitio, ita ut mitissimum futurum esse morbum suspicetur quis; et tamen prorumpunt maculae sat multae, e quibus emergunt pustulae confluentes fere, variolis ipsis non valde absimiles. Vidi equidem etiam in virginibus et adolescentibus, qui vacciola regulariter superata securi horas et dies peregerant ad lectos varioloidibus aegrotorum amicorum, febrem praecursoriam satis exultam cum vomituratione,

et vomitū ipso; at exanthema tamen contra metum non evenit.

Inter symptomata varioloidem nuntiantia angina quoque catarrhalis, mitior modo, modo fortior, saepe saepius a me observata est; eaque in illis, qui varioloidibus laborabant, cum in variola afflictis desideraretur; hoc e. gr. locum habuit in §. 4. et 5.; eandem quoque pro symptomate prodromo habuit puer duodecennarius, qui, contagio hausto e puella variolis aegrotante §. 5., varioloide vaccinica affectus est mitissima. Quare aliquoties mecum computavi, an fortasse haec angina, inter prodromos versata, quae eruptione facta raro longius persistit, singulare possit et characteristicum varioloidis signum dici; ortumque debere peculiari contagii variolosi effectui in organismum non penitus ei faventem? Constitutionis certe atmosphaericae characteri tribui non potest; nam neque morbillos, qui et inter Lipsienses et Variscos tunc grassabantur, comitata est, neque homines catarrhalibus affectionibus huius vel alius formae saepius affici vidi.

§. 4.

Papulas rubicundas, quas febris plerumque die tertio edit, plurimis in casibus oboriri vidi ita, ut variolarum ordinem sequerentur; cum nimirum primum observatae essent in facie, collo et brachiis, sensim in trunco quoque reliquisque artubus permanere. At vero nunc jam ipsi, qui accurate observat, momenta illa sese ostendere incipiunt,

quae variolam inter et varioloidem vaccinica-
rant discrimen; nec minus illa, quae a varicella-
rum agmine segregant varioloidem nostram. Sunt
enim revera inter maculas plures, quae penitus ad
modum variolae sensim in nodulos accrescunt, du-
riores fiunt, regulariter rotundae, prurientes, tactu
praecipue, in medio profundius rubentes, quam
in basi, et postremo, die post eruptionem secundo
acuminatae, atque ad vesiculam componendam
aptae; at proveniunt etiam aliae papulae, quae, cum
vix comparuerint, evanescent iterum statim, neque
ullum relinquunt vestigium; sunt, quae mane or-
tae sub vesperam jam vesiculam gerunt turbulen-
tam. Protruditur porro non uno totum exanthema
pulsu, sed, in qua re omnes, qui observarunt
morbum, consentiunt, singulae post emittuntur pa-
pulae post eruptionem priorem usque ad tertium
diem vel quartum, quae rapidiore semper cursu
advehuntur, et nunquam pustulam excolunt veram.
Tanta est variatio, tantaque inconstantia.

§. 5.

Pustularum tres sunt, uti papularum, e quibus
emergunt, species; sunt *maiores, mediae et minores*.
Primae adaequant quoad magnitudinem pisum fere,
provehuntur sub secundum vel tertium diem e pa-
pula ita, ut cutis in apice distendatur fluido seroso,
tenui, quod lucis radii facili modo permeant; halo
cingit vesiculam laete rubens, tertio die purpureus;
hoc die major cutis pars sursum tollitur, imple-
tur humore jam lymphatico-seroso, lacteo; sub

digitis autem sentitur pustula turgida, elastica, duriuscula; transmutatur nunc porro et magnitudo pustulae punctulo nigrescente notatae et contentum, quod, tertio vel quarto die vulnere emissum, non aequale conspicitur, sed fluidum quidem et serosum, at tamen particulis albidis caseosis commixtum. Sexto demum die vel septimo magnitudinem regularem nacta turget maxime pustula, umbilico ovali depressa, et halone purpureo circumdata; atque in eo esse videtur, ut dehiscat; humor, quem pustula haec, nonnisi pluries acu perforata, evomit omnem, nunc satis magnam habet cum pure similitudinem; est aequalis, mellis tenuioris consistentia, flavus, minus tamen, quam ille ex variolis sumtus, glutinosus.

Mediae pustulae lenticulari sunt magnitudine, quando ad summum cursus sui gradum advectae sunt. Hae secundaria demum eruptione pariuntur, saepe tamen oriuntur e papulis quoque, quas primas jam exanthematis eruptio ejecit; at rapidior, quo incedunt, cursus, impedit, quo minus perfectius excolantur; nam primo plerumque jam die oritur e papula vesicula, quam implet humor lacteus, quarto die jam flavus et densus. Hae quoque pustulae sentiuntur sub digitis duriusculae, at una jam facta incisione edunt omnem, quem continent humorem, nulla in re ab illo, quem majores claudunt, discrepantem.

Minores postremo miliares sunt, secundaria semper eruptione propulsae, varicellis acuminatis non dissimiles; vesicula, halone rubro angusto cin-

cta, humoris lymphatico-serosi quid vix continet, atque mox in crustam transit.

§. 6.

Crustae formatio, ortae ex lymphâ pustularum majorum exsudata, septimo die capere solet initium, primumque in facie, et illis partibus, quae aëris, exsiccantis scilicet, flatui liberius sunt expositae; supersedet illa, primum succinei coloris, deinde fuscî, non nimis crassa, dura, excrescentiae tuberculosae, profunde rubenti; quae levi fovea in apice depressa per septimanas et menses adeo restat, atque ex vento frigidius adflante mox ruborem induit livido-purpureum. Minorum pustularum crustae nihil ferunt discriminis, nisi quoad magnitudinem et colorem quoque, qui ab initio minus profundus est, postea tamen ad colorem succineum accedit; at crustulae, quibus vesiculae miliares obteguntur, squamulas potius adaequant, tennes sunt, basin elevatam vix habent, neque omnino vestigium in cute relinquunt.

§. 7.

Odorem peculiarem percepi pluries, eumque potissimum, ubi stragula, quibus obtegebantur aegroti sursum tollebam, pluresque pustulas acu perforavi; pluries tamen desideravi; quamvis morbus quoad gradum, formam et naturam discriminis nihil ostendebat. Ubicumque vero naribus percipiebatur meis, similis fuit quidem illi, quem varicella spargere solet, at multo mitior, et revera equi-

dem non penitus dissentirem cum Hennen^{*)}, Anglo, qui sulphur fere olere varioloidem contendit; at difficile sane est opus, odoris discrimina ita denominare, ut cuique respondeant; cum suis quisque modo percipiat, aliisque, qualis ab ipso percipiatur, describit; quare hanc quidem aliis traditam esse provinciam volo, quorum nares acumine majore fortasse sunt exstructae.

§. 8.

Exit morbus plurimis in casibus in valetudinem pristinam, quod Heim^{**}) adeo vidit, ubi petechiae accedentes malum morbi characterem nuntiaverant; recordor tamen Lipsiae varioloidem enecasse puellam; at angina vehementissima, penitusque tamen neglecta, animam rapuit; ita ante breve tempus nuntius mihi datus est, varioloidi septimo post eruptionem die supervenisse morbillos lethales; et paucae aliae quoque exstant relationes de varioloide lethali; semper autem aut pessima complicatio aut aegrotantis constitutio penitus invalida ita hostilem exercent effectum. Pro morbo secundario semel in puella scrophulosa abscessus plures in temporibus, collo et brachiis, varioloide septimanas ante tres superata oriundas vidi; at reme-

*) Hennen on eruptive diseases, which have lately prevailed etc. in Edinb. Journ. N. 56. p. 453. cf. Lüder's *Versuch einer krit. Gesch.* p. 114.

***) Heim „*Meine jetsige Ansicht etc.*“ Horn's *Archiv* 1825. p. 6.

diorum laxantium, deinde coctionem ciborum corrigentium et roborantium usus valetudinis pristinae statum mox revocavit.

§. 9.

Brevibus nunc postremo edamus lineis comparisonem et discrimen variolam inter et varioloidem; ipsamque inter et varicellam, quibus, quomodo variolois vaccinica dignoscatur intelligamus.

Communia cum variola haecce habet variolois symptomata: febris praecursoriae vehementiam, systematis gastrico-biliosi turbationem, interdum etiam dolores sacrales, convulsiones, aliaque, quae vehementiorem medullae spinalis indicant affectionem; tumorem cutis exanthemati prae euntem, ordinem, quo exanthema e singulis corporis partibus provenit, papulae formam et ejus in pustulam accrescendi rationem usque ad quintum diem, umbilicum pustulae apici insidentem; at differt variolois a variola eo, quod multo breviori tempore ad crustas formandas proficiscitur, atque, cum usque ad pustulae maturitatis stadium satis lente ingressa sit, nunc extemplo rapido vehitur cursu; nam vera suppuratio non, febris secundaria raro observatur; differt porro a variola, quod cicatrices huic proprias non relinquit, sed earum loco elevat cutem in tuberculum peculiare; mitissimum plerumque induit characterem, neque usquam in organismi structuram et vitam tanta saevitia arma gerit, qua variolam hoc ipso tempore non raro pulcherrimos fregisse flores prohi dolor! vidimus. Cum varicella quoque

habet variolois aliqua communia, aliis tamen effertur; ad priora pertinet mitis ipse character, deinde quod plures papulae remanere solent, ita ut neque attollantur neque impleantur; quod semper pustularum eruptio aliquot per dies continuatur; minores pustulae, quae semper una cum majoribus observantur, quoad formam exhibent cum varicellis similitudinem, atque postremo suppuratio et febris secundaria desideratur; at enim vero sejungitur variolois a varicellis partim illis symptomatibus, quae varioloidem ad variolam accedere faciunt, partim singulari et characteristico signo, quod variolois habet in constante ista ratione crustarum conformandarum, quae longe crassiores, quam quas varicella ostendit, insident basi tuberculosae.

At oritur nunc quaestio, an revera ita sit variolois comparata, quae proprium inter morbos teneat locum, aut melius et rectius vel variolae vel varicellae, cum quarum utraque aliqua habet una, subdatur pro varietate? cui quaestioni, ut paulo fusius exponeremus, singularem esse voluimus sectionem.

SECT. II. *Systematica.*

§. 1.

Admodum diversa sunt medicorum de loco, quo ponant varioloidem, placita, ita ut, cum alteri novum morbum e remota terrae regione ad nos transportatum esse timidule conclament, alteri varicellae speciem tanto clamore describi subridentes obstupescant. Ad priores pertinet *Moreau de Ionnes*,*) qui varioloidem ex India terrae Anglorum ante decem fere annos mercatoribus esse adportatam, periculique, vacciola non compescendam, multum minari contendit; at primum valida, quibus confirmetur sententia, desiderantur argumenta, et erunt pauci, uti putaverim, qui in ipsius partes pedibus ire velint; deinde vero *Hufeland*,**) ei jam adversatus est, atque plane cassum ejus nuntium esse demonstravit, quare equidem rem penitus missam facere praeferam. At num audiendi sunt illi, qui, uti privatim disserentes plures

*) *Moreau de Ionnes*; *das ansteckende Varioloid, dargestellt von M. d. J.* vid. *Neue Jahrbücher der deutschen Medizin*; von *Harless*, Supplementbd. 1827 p. 105. (*Bulletin des sciences medicales*; Paris Decbr. 1826.)

**) vid. *Hufeland's Journal* 1827. Jan.

audivi, sententiam de varioloide orta in India abjiciunt quidem, at contendunt tamen, esse illam morbum sui generis, eamque nunc grassari per Germaniam eodem modo, uti inter Scottos observatam esse, Thomson*) descripserit? Dictitare isti solent, veram variolam non esse a nobis observatam, sed varioloidem, morbum variolosum propriae indolis; ejusque semen ab omnibus recipi posse hominibus; at inclinare tamen homines, neque variolam, neque vacciolam unquam passos maxime, minus illos, quibus vacciola insita sit, omnium minime, quos variola vera unquam affecerit. At vero falli mihi videntur illi variolae per varias constitutiones diverse immutandae forma; ita enim ludit natura in morborum, praecipue exanthematicorum, formis componendis, ut idem morbus in alio homine, sub alio coelo, alio vento flante, plane alius agnoscatur morbus. Nos nuper variolam veram inter nos grassantem vidisse, demonstrare possunt exempla millia, quae imaginem variolae ita compositam demonstrant, ut sub Sydenhami oculis versatam illam esse quis suspicetur; sane alii homines vacciolae expertes variolam gesserunt in corporibus suis tam mitis characteris, tamque modificatae formae, ut tiro non vidisset variolam, nisi ducibus instructus versatis, qui olim jam permultos variola afflictos observaverant. At enim vero talis fuit omni

*) John Thoms, an account of the varioloid epidemic, which has lately prev. etc. 1818. cf. *Lüders Vers.* p. 132.

tempore variola, quae aëre, tempestate, et anno nunc hanc, nunc aliam induit formam; idque bene monuit Sydenhamus*), cujus vim et artem in observanda et depingenda natura quis unquam sufficienter laudabit? hisce verbis: „Ita ludit natura in „epidemiarum generatione! non variam febrem so- „lum, sed formam quoque variolarum variam pro- „vehit;“ id quod aliis locis multis demonstravit. Atque Chr. Lud. Hoffmann**) dicit aliquo loco: „Ich glaube schwerlich, dass es ausser der Variola „eine Krankheit in der Welt giebt, welche unter „so mancherlei Formen auf der Bühne erscheint.“ Porro supervidere etiam videntur isti, quantopere et quam constanter morbi decursus, forma et character in hominibus vacciolam passis regulari effectum (in quam rem ut recte inquiratur, nunquam satis strenue potest moneri) differat ab illo in aliis, qui neque vacciolam, neque variolam in corporibus suis viderunt.

§. 2.

Postremo brevibus hic referenda est observatio Francogalli cujusdam, Guillou***), qui,

*) Sydenhami opera universa medica ex edit. Kühn. p. 107. cf. ceterum in eodem libro p. 171 ad 172; p. 1. 74; p. 202; p. 83. p. 106; p. 220.

**) vid. Krause, d. Schutzpockenimpfung in ihr. endl. Entscheidung als Angelegenheit des Staates und der Einzelnen, Nürnberg 1820. p. 453, Anm.

***) Froriep's Notizen aus dem Geb. der Natur und Heilk. XVI, 22, 1827. N. 331. (Nouvelle Bibliothèque medicinale, Jan. 1826.)

(versans in oppido St. Pol de Leon, in Franco-galliae regione Finisterre dicta) nuntium dat Dr. Kergaradec: „se lympham haustam ex pustula varioloidis, dictae variolae cornée, inseruisse pueris, atque vacciolam efflorescentem vidisse penitus regularem;“ qualem rem equidem, cum aliorum experimenta (de quibus infra sermo erit) docuerint contrarium, ita explicarem, nisi omnis referenti deneganda sit fides, ut contenderem, idem ei accidisse quod Hispano cuidam, Dr. Don Josef de Antonio*) olim Extremaduræ versanti, qui aliquando, cum lymphæ vaccinica careret, variolæ insitione epidemiae vehementiam fracturus pus variolosum laminis suscepit vitreis, quibus ante aliquod tempus lympham e vacciolis sumtam conservaverat; hic quoque non, quam exspectaverat variolæ insitæ eruptionem, at unicam e vulnuscule pustulam, vacciolæ perquam similem, vidit proveniente.

§. 3.

Transeamus nunc a singulis illis ad longe majorem numerum eorum, qui aut variola comprehendant, aut varicellis annectunt varioloidem.

Alteri enim, cum videant, multa quidem esse momenta in varioloide nostra, quæ magnam loquantur similitudinem ipsam inter et variolam, segregari pro peculiari specie nolunt, monentes variolam illam, quocunque casu modificandam, moderandam atque mitigandam, mitiorem tantum red-

F or. Notiz. Aug. 1823. N. 94. Sp. 92.

di vacciola, quae dispositionis quantum subtraxerit; supervident scilicet, esse quaedam symptomata satis perspicua et constantia, quibus nonnisi in homine vacciolae insitionem passo variola sit elata et characteristice notata.

Aleri autem, qui partim tutelae per vacciolam acquirendae defensores nimis strenui, negant, homines vacciola insita tutos posse affici contagio varioloso, partim similitudinem varioloidis cum varicella ita respiciunt, ut, quae dissimilia sint, negligant, varicellarum agmen adaugent varioloide etiam. Facile tamen plerumque est videre, quantopere claudicet talis classificatio, in qua, cur ita collocetur, causa desideratur. Confer exempli gratia mihi, quod Rayer *) dicit; qui quoque varioloidem pro varicellarum specie describit: „*varicelle pustuleuse ombiliquée* (quo nomine scilicet varioloidem vaccinicam ille se cogitare dicit,) *est de toutes les variétés celle, qui se rapproche le plus de la variole, dont elle ne diffère réellement, que par la marche plus rapide de ses pustules, dont les aureoles moins enflammées sont plus rarement suivies de cicatrices.*“

§. 4.

Est *variolois vaccinica* secunda species morbi variolosi, generis, cujus prima et suprema va-

*) Rayer, traité théorique et pratique des maladies de la peau; fondé sur de nouvelles recherches d'anatomie et de physiol. pathologiq. A Paris 1826, p. 349.

riola, proprie sic dicta, tertia vero *varicella* est.

Accedit autem variolois longe propius ad variolam, praeter quod externam gerit similitudinem, sede etiam et structura pustulae, deinde vero quoad vim et facultatem, qua pollet lymph a varioloidea, supremam morbi variolosi speciem aptis procreandi conditionibus.

§. 5.

Quod Sacco *) certe docet et pro characteristica commendat nota, variolam in *corio* habere radices, varicellam aliaque exanthemata in cuticula tantum crescere, haud dubie hodie etiam verum habetur; eo magis cum anatomia demonstrari possit. Abit corium in varias cellulas, ad quas vasa minima adducunt vitam adauctam, eamque ad inflammationem accedere faciunt; lymph a vasiculis irritatis secreta formatur in pus, quod postremo exsudatur; suppuratio vehemens esse non potest, nisi ita, ut cicatrix relinquatur perspicua, alba, in cuius fundo punctula nigrescentia structuram cellulosa[m] pristina[m] variolae clare loquuntur; at sae-

*) Sacco, *Neue Entdeckungen über die Kuhp., der Mauke, u. Schaafp., übersetzt von Sprengel, Leipz. 1812; p. 11.*

cf. Lüders, *Versuch einer krit. Gesch. der Bl. bei Vaccinirten.* p. 111.

cf. Gendrin, *Anatom. Beschreibg. d. Entzündung u. ihr. Folg. in d. verschied. Geweb. des menschlichen Körpers. Uebers. v. Radius. Leipz. 1828. p. 353.*

pe eūiam fit, ut in variola discreta benigna pus regulari temporis spatio excretum resorbeatur iterum, aliisque viis excretoriis evacuetur; quod ubi fit, cūlis non tantopere destruitur cicatricibus *), at variola relinquit corium tumidum, cūm cuticula concretum, vasis dilatatis instructum.

Est igitur variola glandula quasi transitoria, cuius functione et vi specifica pus variolosum concoquitur; quod ubi factum est, organon jam porro supervacaneum solvitur atque aufertur.

Illam vero sedem in corio et structuram cellulosa[m] habet variolois etiam; quae ab initio cursum et rationem variolae penitus imitatur, mox autem sese propria carere vita, qua longe debiliore et lentiore esse instructam ostendit; inde fit ut lympham, quam, si quis vulnere evacuavit, contra variolae modum non restituit, in pus mutare nequeat; areola, quae roseo variolam, ex suppuratione recens inflammata[m], cingit colore, liveat in varioloide non suppurante, atque pustula rapido feratur cursu ad terminum, quo crustam conformat. Cicatrix necessario desideratur, quoniam suppuratio deest, cuius loco induratio aliqua observatur, qua corium concrescit cūm cuticula, et tuberculosam inde efficit excrescentiam singularem, vasiculis dilatatis suffusam.

*) cf. Sydenham. p. 107.

§. 6.

Alterum autem momentum, quod variolae appropinquat varioloidem, facultas lymphae est, e perfecta varioloide sumtae, quamvis effoetae neque satis coctae, procreandi in corpore, vacciolae experte, variolam; minus quidem infectione spontanea, quam potius artificiali insitione. Consentunt in hac re, quantum ego scio, omnes, qui varioloidem fusius descripserint; accuratius tamen referunt pauci; pertinent ad ipsos Willan*) et Hennen**), Angli; Heimius***) e nostratibus; hic luget adeo, puerum aliquando morte esse raptum, cui, vacciolae experti, lympham e varioloidis pustula haustam inseruerat, (putabat enim, qualis fuit ejus olim sententia, varicellas ita proventuras esse), et variolam malitiosam inde orientem vidit. Angli illi eodem modo variolas conspexerunt oriundas, lympham varioloidea insita; Willan distinctas quidem et benignas, ita tamen quoad formam et cursum comparatas, ut de vera variolae natura dubitari non posset; eo minus, quod neque vaccinae insitio, neque contactus hominum variolis laborantium ullum effectum postea habuit; ita Hennen quoque,

*) Willan, *Ueber Kuhpockenimpfung. Uebers. mit Zus. von Mühry. Göttingen 1808.*

**) Hennen, vid. in *Edinb. Journ.* N. 56. October 1828.

cf. Lüders *Vers.* p. 17, 18, und p. 40.

***) Heim, in *Horns Archiv*, 1825, Januar.

qui mortem adeo insecutam observavit in viro, qui ex varioloide contagium susceperat.

Spontanea infectio raro observata est; neque mirum, quoniam lymphæ varioloidis volatilem illam non nacta est naturam; febris etiam secundariae; quæ, ut cum Lüders consentiam, haud dubie sphaeræ contagiosæ majorem præbet ambitum, absentia impedit. Vidi tamen semel Lipsiæ puellam tempore, quo variola tollere caput vix inceperat, vacciolæ expertem corripì variola, perbenigna quidem; dum duæ sorores, natu majores, varioloide vehementiore laborabant. Usus autem alium locum habuisse cum hominibus variolis afflictis, a parentibus strenue negabatur.

Pluries vidi varicellas et mites et vehementiores oriri in pueris vacciolam passis, dum aderant, qui varioloidibus aegrotarent; ita e. gr. fratrum Eduardi B. (vid. §. 3.) uterque varicellis correptus est, cum parentes, apud quos transegerant ferias, vix reliquissent; simileque aliis in locis saepius observavi. Quare nunc non plane alienum erit, qualis sit connexus contagii variolam inter et varicellam, paucis disquirere.

§. 7.

Nuperrime demum de hac quaestione agitiùs disceptaverunt medici; at verò vix plura sunt eruta, quam quæ Van Swieten*) jam monet, ubi

*) Van Swieten, Commentar. in Boerh. Aphorism.; Lugd. Batav. ed. III, 1735. Vol. V. p. 10 et 11.

de varicellis facit verba: „an simile contagium in
„his ac in genuinis variolis, sed quod effectum jam
„vel magis iners ex sua natura turbat corpus minus
„valide, vel facilius diffatur absque suppuratione
„sequente? Sic quidem crediderunt, cum videbant
„spurias variclas regnare, postquam verae grassari
„desinebant; interim videtur obstare, quod variolae
„illae spuriae etiam illos infestaverint, qui ante pau-
„cos menses a veris variolis sanati erant; qui tamen
„solent a contagio varioloso postea immunes esse;
„praeterea spurias variolas passi saepe paulo post labo-
„rant veris variolis, si tunc temporis grassantur.“

Exstant *) quidem plura experimenta et ob-
servata, ortam esse varicellam, ubi pus variolosum hoc
in consilium aqua dilutum, vel putredine corru-
ptum insitum esset pueris; at propagata iterum est
varicella insitione, pro morbo igitur constante et
proprio; ita ut, quocumque etiam nomina sancta
nobis et adorata alteri alterive sententiae decori
sint et tutelae, totidem etiam non minus elatis sub-
trahatur talis autoritas, quae, quo minus ingenia
minoris pretii cuncta attrahat, impeditur. Siqui-
dem, quandocumque verum demonstrare nequeunt,
suspiciari licet, haec fere sententia mea erit.

Morbus variolosus est omnino morbus *conta-*
giosus, seu talis, qui materia aliqua peculiari mor-
bi acme vel stadio maturitatis seminis instar secre-

*) Vid. Lüders Vers, etc. p. 122. Contra Lüdersi opi-
nionem accedit, uti demonstravi, Van Sw. potius ad
illos, qui negant, varicellam oriri directe e contagio
varioloso.

ta, ab altero organismo ad alterum propagatur contactu; at est epidemicus quoque morbus, seu talis, qui in aliqua terrae regione ob certam aëris, anni, temperaturae, atmosphaerae constitutionem, sensim crescentem, in quoque organismo fundum habet sibi adaptatum atque evolutioni suae faventem.

Tale miasma, variis momentis productum, organismo certam indicat viam, qua insuavem illum statum, in se ob communem atmosphaerae turbationem ortum, vincat; suscipiuntur fortiora molimina, febris exardet, et pro crisi protruditur inter alia exanthema quoque, quod, si apparuit cursumque suum a natura praescriptum absolvit, valetudinem in pristinos retrahit fines. At potest exanthema, quando quidem miasma tale est, quod, ut crisis per cutem proveniat, efficiat, variam induere formam: aut inflammationis supra totam fere cutem expansae, scarlatinae; aut singulas ejus particulas obtinentis, morbillorum et rubeolarum; aut pustularum et vesicularum, morbi variolosi. Ex illa organismi inclinatione, miasmatis effectum cute removendi, sequitur epidemia plerumque non unius febris exanthematicae; sed plures febres ejus indolis sese excipiunt; ita morbilli variolas sequuntur modo, modoj istis praecedunt *); id quod hoc quoque tempore observatum a nobis est.

Permagnam tamen variolae et varicellae, quamvis suum quaeque characterem et cursum ostendit, habeant necesse est miasmata similitudinem; ita ut,

*) Vid. Kiesers System d. Medicin. Halae 1817. p. 686.

si e momentis constitutionem atmosphaericam componentibus singula absunt, varicella oriatur; aliisque contra fortioribus additis variola propullulet, superior mimimum morbi variolosi gradus.

Saepe inde quidem fit, ut varicella solum gignatur, eaque grassante jam penitus atmosphaerae constitutio immutetur; saepius tamen, ut hic prior tantum sit partus, quo edito gravis atmosphaera secundam etiam sobolem, variolam, enititur. Gignitur enim variola, quando ad miasma accedunt alia momenta, ejus vim adangentia atque evolventia; praesertim, ubi contagium fortasse in quodam homine, qui eximiam in se gerebat dispositionem variolae faventem, est concoctum; quippe quo omnis atmosphaera nunc variolae propriae infectionem facilius et volatilius molitur, ita fere, uti chrysalidis in salina solutione ad chrysalides componendos apta, tunc demum valide conformari incipiunt, quando chrysalis jam conformatus injicitur.

Affinitas igitur variolam inter et varicellam exstat quoad ortum miasmaticum; differunt vero et morbi ex illo oriundi, et contagia. Attamen contagio variolae possunt opponi impedimenta plura, quibus inferiore iterum collocetur morbus gradu.

Pertinet ad illa impedimenta vacciola quoque, qua superata plerumque tollitur penitus contagii variolosi vis, interdum tamen debilitatur, interdum mitigatur tantum. Nam extra dubitationis aleam positum est, plures homines, vaccina tutos et inter Anglos et Francogallos et Germanos hausto contagio varioloso affectos esse varicellis, quem titu-

lum jure sibi vindicant praecipue; ut de reliquis taceam, ob sedem sub epidermide sola. Eam vero varicellarum varietatem peculiari nomine insignire, uti Lüders vult, penitus supervacaneum et falsum adeo videtur; quoniam nihil illa ostendit singulare, nihilque, quo a reliquis recedat varicellis.

Quando autem minore etiam vi vacciola resistit contagio varioloso, exanthema variolae proprius et similis exoritur, *variolois vaccinica*; quae sedem quidem et structuram habet variolae; cursum vero rapidiorem, characterem mitem et formam paulo mutata vacciolae debet superatae.

Eo minus autem in vocem *varioloidis*, quam a multis ad genuinas legimus adscriptam, strenue inquirere volumus, quo revera difficilius erit opus aliam excogitare, quae non eadem sed meliore ratione faciat aliquem attentum in similitudinem, quam noster habet morbus cum variola, a qua tamen maxime iterum recedit eo effectum, quem vacciola in organismum exercuit; quare *vaccinica* jure meritoque insignitur variolois.

Quid vero? ergo vacillant pedes, quibus gloria vacciolae ingredi solebat? Nonne plane compescit variolam, crudelem illam et timendam? Quid tandem est in culpa, quod homines, regulariter vacciolam passi, contagio tamen varioloso afficiuntur?

Quam rem, ut paulo exquisitius investigemus, transeamus nunc ad sectionem III, quae inscribitur Pathogenia.

etiam in laicis, sed et medicis etiam
 nuper exorta est dubitatio de tutelae, qualem vac-
 ciola superata contra variolam promittere solebat,
 certitudine, atque quod Cuvier aliquo loco asse-
 rit, „Il n'y a point dans la nature de phénomène
 à la fois aussi surprenant et aussi certain,
 „que la Vaccine“ ad fallacias referendum esse nunc
 videbatur, cum in hominibus vacciolam passis ef-
 florerit, exanthema, quod cum variolis propriis
 convenire, homines rei non satis gravi persuadebant
 sibi. Nunc quidem jam alia sententia foveri
 incepta est; atque, quod de vacciolae insitionem
 gloria et laude penitus privaret atque homines hor-
 rori, exponeret recentius, timebatur, imo jam grata
 quasi mente observatur, nam triumphum potius agit
 mos ille, habetque hominum societas, quod Jen-
 nero a recente benedicat. Non est variola, quam
 in corporibus vacciolam regulariter passis vidimus,
 propria, crudelis illa, et jure vitanda, quae non
 raro externam non solummodo abolet specie, sed

§. 1.

ab illa

D

totam adeo frangit valetudinem; sed est potius longe mitior variolosi morbi species, per se nunquam lethalis, rarissime periculosa; quod satis demonstrasse nobis videmur; at vero est tamen contagii variolosi effectus; et hoc quoque mirantes nos facit et dubitantes, quaeriturque, quomodo explicandum sit tale phaenomenon, et num illa spes: fore, ut variolae propriae vacciolarum auxilio penitus a terrarum orbe removeri possint, plane sit abjicienda.

§. 2.

Duplex autem praecipue mihi videtur causa, cur tutelam suam praestare nunc non potuerit vacciola; altera haec est: vacciola non ita ad organismi fontes permeavit, uti postulatur; altera vero: epidemiae constitutionis vehementia tanta est, ut vacciola, quae revera omnem effectum excoluit suum, satis tamen resistere non possit; de quibus singulis jam, quantum ego poteroy, expositurus sum mentem meam.

§. 3.

Quandocumque vacciola organismum non ita immutaverit, uti ad effectum perfectum desideratur, causa aut latet in vacciolae insitione ipsa, aut in illius, cui insita est, ratione.

§. 4.

Paucae quidem sunt in re medica institutiones, quae tanto fervore receptae sint, tamve cito omnes

fere animos in se rapuerint, praeter vacciolae insitionem; at dubito sane, an multae exsistent, quae tanta etiam negligentia, tanta levitate, tantave arrogantia exercitae sint. Res, in qua heroes doctrinae nostrae non cautos satis, sagacesve sese versari posse confitentur, vetulis relictæ est, pharmacopolis, balneatoribus, hominibus, qui partim artis penitus ignari, et securi vidisse aliquid, quaecunque fuerit, e volnusculis propulsum; partim, lucri appetentes, et contenti, insiluisse aliquid in sacculos, non anxie quaerebant de forma vel decursu regulari, certe nunquam, etiamsi fortasse aliquid, quod praeter normam fuerit, observaverint, sese admonitos putabant, ut vacciolae insitionem repeterent, et num fallerentur an confirmarentur in suspitione, inquirerent. Quid? sunt medicorum adeo plures, qui provinciam suam minore administraverint industria, quam quae necessaria est, ut ea porrigatur hominum societati salus, quam tradere illi debent et possunt. Quare hoc sane mirum fuisset, si poenas non dedisset tanta negligentia.

§. 5.

Observatae pluries sunt variolae propriae in Hominibus, qui vacciolam passi esse dicebantur; at vero num ullus fuisset vacciolae insitæ effectus, an dubius, an non sufficiens, nullus est qui dicat; cum aut profanum vulgus, aut medici minus cauti vel providentes artem exercuerint. Nullibi autem est legere, hominem aliquem incidisse in variolam veram, quando medicus fide dignus normalem vac-

ciolae decursum observatum esse, testari poterat. Millia potius loquuntur exempla benignum istum effectum, quo vacciola, organismi indole et ratione immutata, tutos reddiderit homines a variolarum, quibus centies erant expositi, infectione. Variolosis autem postea oriri solet, quando in vacciolae insitae forma, decursu et caractere necessarij quid desiderabatur.

§. 6.

Nolo equidem noctuas ferre Athenas, regulasque, quae in vacciola inserenda colendae sint, commendatas centies, repetere; praesertim cum hac ratione nimis extensos dissertatiunculae darem terminos. Quaerendum tamen est, cum perfectus vacciolae effectus is sit, qui et nervos et vasa immutat ita, ut a virulenta contagii variolosi vi porro non afficiantur, quid tandem sit externum hujus immutationis signum. Quod ut indicant alteri febrem, alteri affectionis localis vehementiam solam esse respiciendam et postulandam contendere amant. Quoad priorem Jenner*) ipse jam monebat: si modo pustula stadia sua percurreret regulariter, febris praesentiam non tam necessarie postulari; ipsa autem saepius etiam supervidetur fortasse, ubi tamen adest, etsi exigua; praecipue in infantibus, in quibus exiguis genarum rubor, ca-

*) *Jenners nachgelassener Brief an Hrn. Dr. Roumont zu Aachen vom Jahre 1801. vid. in Hufeland's Journal 1827. Decbr. p. 29-32.*

pitis calor, leve insomnium, mammaeque appetitus fortior, sufficiens jam febriculae praesentis praebent indicium. Neque erysipelatosus brachii totius rubor et tumor, dolor tensivus, et reliqua similia tantopere sunt quaerenda; quae, in insitione lymphae vacciolae nativae observata, in vacciola per lympham ex hominum vacciolis haustam insita desiderari, non raro audimus lugentes medicos. Pro re primaria haud dubie respicienda sunt praeter febrem: decursus, forma, et areola; haec enim exempli causa a Jennero*), qui tribus hominum millibus vacciolam inseruerat, semel tantum desiderata est. Quod attinet ad cicatricum speciem propriam, tales haud dubie multi faciendae sunt, ut cognoscatur, qualem habuerit vacciolae insitio olim instituta effectum; atque regula valet haec**): cicatrix esto post plures etiam annos circumscripta, rotunda, marginibus serratis carens, fundo concavo, fulgente, pergamentaceo fere, vix reliqua cute albidiores, pleno foveolis, quae uti punctula nigrescentia conspiciantur. Haec enim punctula necessario requiruntur, utpote indicia et vestigia, normalem fuisse vacciolae structuram cellulosa***). Non dubito tamen, posse in homine, qui sane regulariter vacciolam passus sit, desidera-

*) *Willan, über Kuhpockenimpfung; übersetzt von Mühry, Götting. 1808. p. 77. cf. Sacco neue Entdeckung etc. p. 11.*

**) *vid. Krause. l. c. p. 284.*

***) *Sacco. Neue Entdeck. etc. p. 34.*

ri etiam cicatricem, uti in variola, quæ quoque cicatrices interdum non relinquit. Ita inserui equidem virgini duodeviginti annos natae, quæ primum vitæ annum agens vacciolam passa esse referebatur, iterum lympham vaccinicam et vacciola regulari sumtam, quoniam metus, ne contagium variolosum ipsam inficeret, eo magis premeret, cum cicatrices in brachio, quod etsi accuratissime inspicerem, penitus desiderarentur. In infantibus illis, quibus eodem tempore eandem lympham tradidi, vacciola plane regularis effloruit, at in virgine contra expectationem non alius se dabat conspicendum effectus, quam qualem in hominibus observavi regulariter revera passis vacciolam, quibus quoque, partim rogatus, partim explorandi causa, vice iterata lympham inserui.

§. 7.

Abnormi modo quando provehitur vacciola, observatur *vaccinella*, quæ ante justum tempus protruditur, minor pari est, areolam non habet, neque febrem procreat, et stigmate punctulis notato caret.

§. 8.

Potest hæc quidem vaccinella satis prope accedere ad variolæ genuinæ rationem, atque simili fere modo, quam hæc, organismum immutare; tunc contagium variolosum, ubi adit ad corpus, non omni, qua pollet, vehementia, infestat illud; virulentam tamen vim suam non penitus denegat, et

varioloïdem producit. Quandocunque vero magis etiam vaccinnella a vera indole recedat, securus omnino non potest organismus esse, qui tunc, contagio varioloso expositus, variolis propriis afficitur.

§. 9.

Oritur talis vaccinnella, contra variolas non tutoria, primum omnibus illis momentis, quae, quominus vacciola cursum suum absolvat, impediunt. Necessario requiritur, ut una certe vacciola, nullo impedimento turbata ad terminum regularem provehatur. Potest enim pustula laesa suppuratio sequi satis profunda, indeque cicatrix quoque; at vacciola effectum, qui optatur, tamen non exhibet. Ita vidi ego puerum, cui per sex vulnuscula lympham inserueram, digitis septimo post insitionem die omnes radere pustulas laete florentes; tertio die postea a me, de effectu dubitante, insitioni iterum subjectus est; atque vacciola nunc plane regularem nacta est speciem, dum suppurbant adhuc vehementer pustulae priore insitione provocatae. Pertinet huc consilium quoque, quod a Bryce*), Anglo quodam, commendatum, nobis neutiquam laudabile est. Suadet ille exploraturis, num vacciola ita revera organismum immutaverit, ut variolam praecaveret: alteri solum primum inserant brachio vacciolae lympham; hauriant ex hac pustula quinto vel sexto die lympham, eamque

*) Bryce in Edinb. medic. and surgical journ. 1805, VII. p. 250

immittant alteri brachio. Vidit ipse, uti **Lüders** quoque et alii vacciolam recentioris ortus rapido cursu vacciolam prius natam sequi, ita ut una cum hac acmes stadium attingeret. Inter alia porro, quae in inserendi actione cavenda sunt et curanda, illud quoque respiciatur, ne sub solis radiis vel vento vehementius flante lymphæ immittatur; ita vidi, vaccinellam esse ortam, cum vulnusculum statim post insitionem aliquod per tempus radiis solis expositum esset, dum in aliis eadem hora, eademque lymphæ imbutis, quorum brachia indusio obtgebantur, vacciola plane regularis oboriretur. Aliam causam eo minus cogitare potui, quoniam insitio repetita plane justam vacciolæ speciem provexit. Idem observavi etiam, quando aëris flatus vehementior et impuris fortasse vaporibus inpraegnatus inter actum inserendi advolabat ad vulnusculum, cui tradebatur modo lymphæ vaccinica.

§. 10.

At oritur vacciola spuria saepissime ob lymphæ, quæ adhibita est, mancā et ineptam rationem; in qua re providentia et cura maxima est commendanda. Manca enim vel plane inepta est illa lymphæ vaccinica, quæ e vacciolis vaccarum spuriis sumebatur*), porro quam homines cachectici**), præcipue morbis cutaneis chronicis af-

*) **Lüders** vacciolarum nativarum historia. Kiel 1826. cf. Sacco l. c. p. 62 ff. ff.

**) Sunt quidem, qui maximam in desumenda lymphæ curam ea de causa commendant, quoniam sibi habent

fetti, vel virilem jam aetatem ingressi, vel variolam aut vacciolam olim jam passi, gerunt in vacciolis suis; deinde quæ stadio vacciolae nimis provecto, vel sub usu remediorum hausta est. Eximia postremo est adhibenda diligentia, ubi lymphæ non statim potest e pustula in vulnusculum transportari; arcenda enim est ab aëre, luce, humore, odoribus fortioribus, ardoris et frigoris gradu nimio.

§. 11.

At enim vero vacciola omnia interdum, quaecunque ad perfectam imaginem pertineant, ostendit; (etsi gradus fortasse paulo minus intensus fuerit) et reviviscit tamen post aliquod tempus propria illa corporis relatio, quæ subjicit iterum organismum contagii variolosi infectioni. Idque momentum persaepe putaverim esse accusandum, quippe quod varioloidis vehementioris adeo ortui faveat.

Hanc sententiam cum paulo fusius explicaturus sim, illis me responsurum esse cogito dictantibus: vacciolae tutelam per aliquot tantum (decem vel plures) manere annos; ipsisque elapsis

persuasum, posse scrophuloseos, rhachitidis aliorumque morborum similium seminia ad validos pueros lymphæ vaccinica transportari. Illi vero in nimiam anxietatem et subtilitatem, cujus ne argumenta quidem neque e theoria sana, neque ex experientia pura possunt afferre, incidisse videntur. Pertinet ad illos Dr. Leo Wolf, *die Gefahren der bisher befolgten Maassregeln zur Verbreitung der Kuhpocken. Hamburg. 1822.*

iterum esse lympham vaccinica[m] inserendam; quo modo illi, si regulam ubique et quocunque casu colendam et exercendam dare student, falsi quid docere mihi videntur. Tot enim exstant exempla, tutelam, quam vacciolae insitio praestitit, in hominibus, ubi omnia scilicet momenta et contagii vaccini et dispositionis organismi ita faverent, ut supremum vacciola perfectionis gradum attingeret, per viginti et plures annos esse *conservatam**), ut haec experientia, a quocunque fere medico confirmata, primarias potius agat partes, et componat regulam, quam tamen deservisse sane natura interdum speciem movet.

§. 12.

Non enim raro fit, ut infantibus natu minimis, paucas septimanas vel menses agentibus insecrantur vacciolae; quod medici jure faciunt, ubi variolae grassantur fortasse, eaque de re ne flores teneri frangantur, cavendum est. Noli tamen credere, in hac cute, lanugine adhuc tecta, atque ut brevis sim in re omnibus perquam nota, propria et peculiari vita, qua serius instruitur, penitus carente; quae omnibus contagiis exanthemati-

*) Ita ego, ante viginti tres annos vacciolam passus, centies certe variolas proprias sub oculis et manibus habebam, persaepe pure varioloso inquinatus, et semper tamen ab ullo infectionis vestigio immunis mansi; in qua experientia omnes fere, quibuscum usum habebam, medici juniores consentiunt.

cis minus favet atque raro ab illis sponte afficitur, contagium vaccinicum tales posse radices emittere, ita ad intimos organismi fontes et castra (sit imagini venia) profisci, ipsaque, quo minus variola intret, vallo munire, uti revera fit, quando cutis magis exulta imbuitur lymphâ vaccinica. Haec nervulorum suorum, sensibilitate vivida instructorum, copia majore avidius quasi arripit contagium insitum, alacrius provehit ad organismi centrum, validius pustulam laete florentem procreat, itaque ne variolosum contagium unquam afficiat corpus, penitus et perfecte praecavet.

Illic omnis quidem tutela, quae pro tempore exhiberi poterat, exhibita est; at non per omne vitae spatium durat, sed quoniam post breve tempus cutis magis demum excolitur, illaque ei datur vitae energia nervulorumque alacritas, quae puerilem aetatem contagiis exanthematicis potissimum subijcit, contagium quoque variolosum non totum potest removeri et prohiberi, ejus potius pars affligit organismum, atque ut morbi variolosi species mitior quidem et levior, variolois vaccinica, oriatur, efficit.

§. 13.

Multo magis haec argumentatio locum habet, ubi scrophulosi laborat corpus. Nolo equidem scrophulosin depingendo operam perdere, cujus imago cuique nota sit et perspicua; id tantum, adprecor in memoriam reducatur, quandopere in vere scrophulosis praeter reliquas partes cutis quoque

labefactata sit, singularique vita privata; pallet ut plurimum, collapsa est, sordida quasi et uno verbo passiva. Quum vero saepissime fiat, ut tota scrophulosis, pubertatis spatio peracto, deleatur, ita ut a gnaro etiam vix ejus vestigium sit conspiciendum, cutis quoque, uti patet, tonum, turgorem validum floridamque vitam accipiat opus est.

Exanthematum igitur semina illo tempore, si ingruunt corpus, recipiuntur quidem, at non eo coluntur et explicantur impetu et gradu; tardius quasi tunc temporis natura semen procreat; quum, quod ad hoc provocandum insitum est, quominus omnem suam facultatem edat, impediatur. Quare vacciolae quoque lymphæ tunc per cutem organismo tradita, satis regularem quidem, quantum pro cutis ratione poterat, pustulam protrudit, quæ non abnormi cursu maturata est, semen adeo ad propagationem non ineptum produxit; impedita tamen est a cutis, quæ invia dici potest, languore, quominus nervorum et vasorum centra ita attingere, eorumque functiones sibi evolvendæ et propagandæ arripere posset, uti postulatur necessario, ut totus immutetur organismus, immunisque evadat a variolarum infectione. Itaque contagium variolosum, si tunc, ubi adolescentia recentem dedit florem vitæ et plane nova instruxit nervos sensibilitate et alacritate, corpus irrepat, humum quasi invenit pauperiorem quidem, neque penitus evolutioni suæ faventem, at non plane tamen sterilem. Illud contagium adhortatur organismum et cogit, ut variolæ speciem procreet; hic vero resistit

etiam aliqua ratione, quare variolam rapidiore cursu, neque ad verum maturitatis gradum provehit et tantopere ab ea affici, quam illis, qui vacciolam non habuerant, accidit, non patitur.

§. 14.

Persuasum mihi habeo, et prius et hoc momentum persaepe pro varioloidis causa locum habuisse; prius enim accidisse, pueris, quibus nimis tenera aetate insita est vacciola, ita ut, cum cutis energia demum aliqua gauderet, contagium etiam variolosum avide ab ea recipiatur, quamvis, quin perfecte illud vim suam exhiberet, vacciola prius passa obstabat; alterum vero adolescentibus, prius aetate scrophulosis, dein autem valetudinem plane secundam adeptis, recentique vitae flore exstructis.

Quas sententias eo fortius equidem tueri vellem et defendere, quoniam experimenta aliqua pro vallo mihi sunt et muro. Plures enim homines vacciolae insitioni iteratae subiecti; ita pueros duos, alterum duodecim, alterum decem annorum; utriusque medicus maxime mihi commendatus annum vix primum agenti inseruerat lympham vacciolae effectum, ut mihi assertum est, omni ex parte regulari. Tamen in utroque eorum haecce a me observata sunt: secundo die post insitionem vulnuculorum levis rubor, et nodulus pruriens; quarto erythema, in cuius apice cuticula elevata est in vesiculam lymphae turbulentae vix paucillum continentem; pruriebat vehementius cutis et brachiorum motus dolebat paulum; sexto die vesicula paulo

elator; acuminata lympham purulentam evomit, atque in crustam abitura videbatur, quæ octavo jam die perfecte formata observabatur; areola vera plane non sese dabat conspiciendam; ejus autem loco linea exigua colore purpureo tincta; sub vesperam diei septimi exiguus capitis dolor, calor paulo adauctus, morositas aliqua a matre observata esse dicebantur. In cicatricibus parvis, subrotundis, quæ in cute parum elevata abortae sunt, punctula illa, quæ cicatrices priorum vacciolarum perspicua ostendebant, desiderata sunt a me.

Ex hominibus adolescentibus, quos vacciolæ insitioni repetitæ exposui, alteri plane validi, alteri scrophuloseos signa adhuc gerentes, effectum aliquem omnino non ostendebant; alteri vero, qui prius scrophuloseos minore gradu laboraverant, nunc vero florida gaudent valetudine, similem quidem, exiliorem tamen effectum, quam pueri illi, offerebant.

Non dubito, et pueros illos et hos adolescentes, uti contagio vaccinico non penitus obstiterint, ita a contagio quoque varioloso non plane immunes fuisse futuros; patet tamen, uti exanthema contagio vacciolæ productum ostendebat aliam imaginem, alium cursum, aliasque formam, eadem ratione variolas quoque in organismo ex parte certe immutato alius necessario futuras fuisse indolis.

§. 15.

At enim vero existat porro aliud quoque momentum, quod non raro contagio varioloso in cor-

pus, vacciolam etiam passum, aliquam praebet vim et facultatem, vehementia nimirum constitutionis epidemiae.

§. 16.

Quantopere certae conditiones et mutationes aëris, anni, temperaturae, aliorumque, quae tenentur fortasse adhuc latent, organismo cuique dominantur, plures demonstrant observationes, atque experientia quotidie augenda. Ita exempli gratia Orraens tradit: pesti nova exorta eos quoque de doloribus questos esse partim earum, quas priori tempore furunculi pestilenciales obtexerant; Rush yditi (anno 1703.) tempore, quo febris flava grassabatur, in aliis quoque hominibus, ceterum bene valentibus, flavedinem conjunctivae et cutis, urinam jumentosam, pupillam dilatatam etc. quae cuncta clare loquebantur, epidemiae vim et characterem, ubi nequeat toto impetu agere, organismi tamen functiones perturbare et certa ratione affligere. Idem docent febres illae variolosae sine variolis, quas Hensler, Huxham, Pinel alique plures observaverunt, et characteristica variolarum signa, quae alii quoque morbi intercurrentes, dum variolae grassabantur, testes Sydenham arripuerunt sibi*). Masmata enim aut vaporibus e paludibus evolutibus ortum debent, atque materiam vegeto-animalem subtilissime disparatam constituunt, quae ubicunque

*) Vid. Hieser l. c. §. 707 — §. 716. et Kriuse l. c. p. 462, Anm. 4. et p. 501.

aëris circumvolans organismum quemcunque infestat, irritatque mechanice quasi; aut immutatione solum temperaturae, electricitatis atmosphaericae etc. paritur, atque magis dynamice fere harmoniam virium et functionum organicarum perturbat et distrahit*).

Ita igitur veri non penitus dissimile est, posse hominem quem vacciolam effectu plane regulari passum, et singulorum variolis sporadice affectorum contactui pluries expositum revera tutum et immunem fuisse ab infectione; at vero, quando variola epidemiae vehementia grassatur, tunc variolae inficiendi adaugeri vim et molimen, atque posse nunc hos quoque variolarum contagio affligi, qui antea huic soli resistere valuerint.

Innotuit mihi casus, qui haud parum ad hanc sententiam fovendam et defendendam contribueret. Foemina quaedam, Londini vacciolae insitioni anno quarto subjecta, pluries contagio varioloso exposita, variolis non affecta est, donec variolae epidemiae impetus anno 1826 in Madera ipsam petiit, atque, ne vitam adeo raperet, metum excitavit.

*) cf. *Mongati in Gilberti Annalen Bd. 43, p. unal*
 Ille disquisiturne naturam miasmatum, quae quotannis e paludibus Toscanensibus surgunt, collegit vitris glaciis repletis brumam, quae calore soluta iterum, ab initio clara et pellucida visa est, dein vero flocculos praecipitavit; his flocculi chemicis reagentibus subjecti, ita se dabant compositos, uti materia animalia praebere solet.

Heineken*), hujus observati autor, refert quidem, foeminam propriis affectam esse variolis; quum vero accurata expositio morbi desideretur, equidem putare mallet, varioloidem, vehementiorem fortasse, potius illic observatam esse.

§. 17.

Haec fere sunt, quae equidem de momentis varioloidem producentibus statuere voluerim. Sunt alii, qui comparant varioloidem cum variola bis interdum homines afficiente. Etenim, quamvis haud dubie plures hujusmodi exstant relationes, ubi aut prior aut posterior morbus variolosus non propria variola fuit, sed varicella; nimis tamen subtiles et difficiles illi videntur, qui negant, variolam unquam his petuisse corpus, cujus rei et in veterum et recentiorum scriptis satis multa leguntur testimonia fide dignissima. Plurimae fortasse variolae redeuntes observatae sunt, si priores variolae insitione provocatae erant; atque simile quid fortasse valet ad hoc phaenomenon explicandum, quale ad varioloidis ortum exponendum admonui. Quicumque autem rem explicaturi in idiosyncrasiam attendunt, eos nihil docere audimus, sed confidentes: non audere sese rem exponere; utuntur autem verbo isto pro nube aliqua, qua oculis inspecturis debilitatis subtrahant speciem.

*) Heineken in Lond. med. and Physic. Journ. B. 57. p. 410. cf. Gerson et Julius Magaz. 1827. Aug. sub titulo: *Erfahrungen und Nachrichten etc.*

§. 18.

Est postremo medicorum pars, qui lymphæ vacciolæ degenerationem accusent pro causa varioloidis; illi enim contendunt, lympham vacciolæ duplici ratione posse immutari, primum scilicet ex medicorum vitio, qui lympham, e vacciolis irregularibus haustam, aliis inserant, itaque vaccinellam propagent, variolæ non satis oppugnantem; dein vero vacciolam omnino recessisse a proprio characterē, novam formam recepiſſe atque vim suam variolam rejiciendi amiſſiſſe.

§. 19.

Quod ad horum prius attinet, mentionem revera exhibuimus plurium vitiorum, quibus pro vacciola vera vaccinella oriatur; atque sumitur tamen non raro ex hisce, ut aliis inseratur, lymphæ; ut plurimum vero fit, ut hæc lymphæ inepta aut plane nihil aut vesicula producat, quæ tantopere recedit a norma, ut quisque medicus, non penitus negligens et levis in observando, intelligat statim, iterum esse lympham vacciolæ inserendam; quo facto regularis denuo oboritur vacciola; quoniam vaccinella priore insitione producta penitus fere localis fuit, organismumque omnino non immutavit.

§. 20.

Sententia, lympham vaccinam posse per se ipsam, vel ob illam relationem specificam, quæ ipsam et

organismum humanum interest, a characteris sui ratione et natura recedere, habet defensores suos et fautores, uti Jennerum ipsum, Kinglake, Gölis, de Walther (Bonniensem), non minus quam hostes et osores, uti de Carro, Thomson, Wendt aliosque. A nullo autem, quantum ego scio, tam fuse de hac materia disceptatum, et quodcunque ad hanc sententiam confirmandam afferri possit, collectum est, quam a Lüders. Nihilominus tamen equidem in ejus sententiam ire non potero, duplici retentus causa; priore, quoniam, quae a Lüders allata sunt, non ita rem demonstrant, ut ipsi videtur; deinde autem, cum experientia theoriae illi plane adversatur.

§. 21.

Confitetur Lüders*): „argumenta positive „quidem demonstrantia desiderari ab illis, qui apte „rem affirmare velint; adhörtatur tamen, analogiam „esse adhibendam, quae simile quid pluribus accidiſſe morbis doceat. Habere enim morborum „genera eadem ratione, uti morbi individuorum, „stadia sua incrementi, acmes et decrementi, quibus peractis plane deleantur; ita lepram extinctam „fere esse, syphilidem seculo XVI^{mo}, acutissimam „et perquam maliuosam, longe mitioris nunc esse „characteris; hydropyretum vix per saeculum viguisse; contra verò febrem scarlatino-miliarem esse „ortus recentioris, atque increscere adhuc; item

*) vid. Lüders l. c. p. 161 — 175.

„anginam quoque membranaceam et febrem hy-
drocephalicam.“

§. 22.

Similia de morborum generibus, exsistentiae suae stadia certa percurrentibus, hodie saepius legimus disputari; pluries tamen e theoriis solummodo hausta, vel ob alias theorias excogitata, ita ut, cum certa basi careant et firma, pulchra potius sint, quam vera. Nolo equidem negare, morbos quosdam posse penitus removeri a terrarum orbe; at vero causa tunc latet non in morbi ipsius vita, sed in externis quibusdam momentis, quorum praesentia et absentia aut provocat aut tollit morbum; idque praecipue est admonendum quoad morbos e miasmatibus crescentes, qui necessario porro observari non possunt, quando vitia certa regionis terrae, morum populi, temporis, vitae, e quibus oborirebantur miasmata, tolluntur. Ita hydropyreton revera per breve tempus exstabat; etenim deletum est, ubi miasma illud, morbum procreans, quod avibus adeo (teste Burserio*) animam rapiebat, solutum, et ne suboriretur iterum, curatum est. Quoad lepram simile quid partim valet, partim, quae a Lüders contenduntur, non plane vera esse videntur. Dubius enim sum de lepra, cujus qualem ille cogitaverit speciem, desidero. Horridam istam lepram mosaicam nuper aliquando esse observatam, dubito revera; at quantopere populus, quem

*) Burserii Institut. etc. Lips. 1826. t. I. p. 342.

morbis ille affligere solebat, vitae etiam mutavit rationem? Quare mihi quis rectius videtur docere, lepram illam non per se, cyclo absoluto, sed potius per homines aptius viventes et momenta causalia vitantes remotam esse. L. autem impetiginosa (Anglorum) et l. graeca s. elephantiasis adhuc homines infestat*). Syphilidem nunc multo mitiorem esse et leviolem, quam saeculo decimo sexto, monumentis historicis stabilitur sane; causae, e quibus hoc eveniat, nescimus quidem; quis vero tandem aptis docebit argumentis, syphilidem unquam extinctum iri? Neque majore jure contendere quis possit, febrem scarlatino-miliarem, hydrocephalum acutum, atque anginam membranaeam morbos esse nostris demum saeculis obortos. Pervolvi equidem libellum a Brünig**) editum, quo non inepte autor demonstrare studet, vetustissimis temporibus ab Hippocrate, Corn. Celso, Aëtio et Arabibus febrem scarlatino-miliarem observatam esse. Non diffiteor, quanta instet difficultas in eruenda quaestione, num veteres hoc vel illud exanthema noverint an non; neque, quod Brünig animose contendit, pro certo et vero defendere ausim; at incertius fere, fide indignius atque auda-

*) F. W. Sieber, *Reise nach der Insel Kreta im griechischen Archipelagus im Jahre 1817*. 2. pag. 155.

**) Brünig Georg, *Constitutio epidemica Essendensis anno 1769 — 70. sistens historiam febris scarlatino-miliaris etc.* vid. in praefat.

cuius est contendere, nuper demum aliquam febrem exanthematicam obviam esse factam. Angina vero membranacea et hydrocephalus acutus sunt inter morbos, ^{olim} infantilem aetatem potissimum petentes, qui, quod omnibus patet, nuper demum accuratiori observationi et curae traditi sunt et commendati; inde veri similis mihi videtur, anginam membranaceam, cujus quidem a Bonneto, Ballonio, Tulpio et Rosensteinio mentio, atque a Home monographia exhibetur, ante horum medicorum tempus jam exstitisse. Simile quid haud dubie de hydrocephalo acuto quoque valet, qui, saepe fortasse pro febre verminosa aliove morbo curatus, Rosensteinium demum, ut accuratius describeret, adhortatus est; et, si tamen nostro tempore frequentius obvenit, nonne potius mos, inter coevos nostros obtinens, accusandus est et vituperandus, infantium tenerrimorum jam cerebrum mentis laboribus irritandi, et congerendi illic sanguinem, cuius vitii effectus malitiosus saepius inepta quoque diaceta adaugetur?

Itaque patet, quod a Lüders de hisce morbis contenditur, nisi plane cassum et vagum, tamen perquam esse incertum, neque ita comparatum, ut possit ad aliorum morborum explicationem inde resumí aliquid.

§. 25.

Obstaret praeterea, quod vacciola contra aliorum ita sese habentium morborum morem brevissimo jam tempore ab indole sua recessisse dicitur;

neque explicatur illud alieno fundo, in quo radices ut ponat, cogitur. Comparationem enim contagii vacciolae cum semine plantarum et animalium institui posse, non dubitamus; at vero nihil inde redundat, nulloque jure demonstratio valet: idem ut illi accidat, necesse esse, quoniam in hoc observetur. Liceat nobis infra nostram proponere sententiam de contagii natura et indole, jam ut penitus dimoveam degeneratiōis lymphae vaccinicae ideam, concessam mihi patris mei adferam experientiam. Is, qui per quinque et viginti annos maximo et indefesso studio exercebat vacciolae insitionem, ipseque propriam adeo filiolum, cui, inter primos fere insitioni subjectae, mala complicatio vacciolae cum denſum proventurorum labore animam rapuerat, pro inferiis quasi reliquit, nunquam e vacciolis nativis hausit lympham. Et tamen hac epidemia, inter-Variscos hic et illic satis vehementer grassante, nullum per patrem vacciolam regulariter passorum variola propria affecit, et perpau- ci tantum varioloide laboraverunt; cum pauci omnino exstarent, quibus vacciola nondum insita es- set. Idem quoque vacciolas nostra lymphā provo- catas neque quoad magnitudinem, neque formam etc. recedere videt ab illis, quas olim produxit; asserit, olim quoque vacciolas pusillas, spuriasque observatas esse, dum aut lymphā casu quodam debilitata esset, aut infantis dispositio, ne effectus regularis proveniret, obstitisset. Consentit igitur haec observatio cum illa experientia, quae Beroli-

ni locum habet, ex testimonio istius*), qui opus
a Lüders editum recensuit.

§. 24.

Nunc tandem inquiramus paucis, quid fere de
omnis contagii agendi ratione statuendum sit; spe-
cialim vero, quid de vacciolae contagio, et quo mo-
do intelligi possit tutela, quam vacciola, regulari-
ter stadia sua percurrrens, contra variolas exhibere
solet.

§. 25.

Omne contagium, quod vel fixum, contactu
tantum per partes tenerioris structurae corpus in-
trat, uti syphilidis, psorae contagium; vel volatilius
inspiratione jam et inhalatione inficere valet orga-
nismum, uti contagia exanthematum acutorum, est
mihi virus animale hujus indolis, ut organismi sta-
tum et sensum magis modo, modo minus pertur-
bet atque in pejorem immutet; reactiones autem
interdum satis procellosas quasi, fortissimas, a na-
tura contra susceptas, ita moderetur et ducat, ut
contagium ipsum longe majore copia inde produca-
tur. Parasitarum instar gerunt contagia in se ipsis
principia vitae et propagandi adjumenta; ita ut, si
ullum contagium verum viguerit, haec ipsa existen-
tia pro testi sit, fore ut nunquam possit iterum
deleri. Variarum quidem exstant contagiorum species;
altera enim nonnisi in morborum epidemie gras-

*) Vid. in Hufeland's Bibliothek, Januar p. 45.

santium acme fortuito quasi concoquantur; uti materiae febris luteae excretoriae contagiosam adipisci referuntur indolem*); altera annectunt epidemiorum sibi characterem morborum, unde fit, ut tales morbi modo sporadici solum, modo epidemii evadant, ut variolae, scarlatina etc. altera demum quae vera contagia dici possint, sibi ipsis solum ortum debent, uti syphilis nostro tempore**) (anno enim 1496 epidemie potius grassatam esse illam contendunt). Habent ceterum contagia plura hoc singulare, quod semel tantum organismum vinculis quasi suis subicere possunt; atque ad haec pertinent illa praecipue, quae epidemiae vehementia homines interdum adoriuntur. Verum contagium lymphæ est e vacciolis nativis hausta; quae, cum vice prima brachio hominis insita pustulam provexisset, eaque lympham iterum comparavisset maturam, hac jam re testimonium exhibuit, fore ut, nisi hominis ipsius ars et voluntas deleat ipsam, aptis potius conditionibus perpetuo vivat vigeatque; et cutem hominis ejus jam posse dici humum paternam; alienus autem fundus ille est; contagium terminum, quo tendit, attingere nequit. Talis est, in quo variola propria jam crevit; haec enim eodem modo tollit facultatem vacciolae semen recipiendi, uti variola radices ponere nequit in corpore vacciolam perfecte passo.

*) Kieser l. c. p. 684. §. 698.

**) Kieser l. c. p. 683.

Atque hoc est, de quo in fine pauca disse-
rendi animus mihi est monituro, quaenam causa
sit cogitanda, cur vacciola compescat variolam, et
quisnam inter utramque sit connexus.

§. 26.

Nondum lis est composita, quam Jenner-
rus*) jam de vacciolae ortu movit; hodie etiam
sunt, qui inclinentur sententiae, ortam esse variolam
ex equorum morbo, quem nos dicimus Mauke**);
alii vero, qui vacciolam singularem esse et vaccis
proprium morbum doceant; alii porro, qui putare
ament, variolae contagio ortum debere vacciolam.
Neque jam instat tempus, quo finis disceptationi-

*) Vid. Jenner, *Untersuchung über die Ursachen und Wirkungen der Schutzpocken a. d. Engl. von Dr. Ballhorn, Hannov. 1799. p. 35.*

**) Morbus ille, recenti tempore nomine paronyehiae erysipelatosae insignitus, Francogallis sub titulo Javard, Italis Chierdo vel Giardo cognitus, rarissime teste Excell. Prinz apud nos ita observatur, uti Sacco eum describit; saepissime autem fit, ut equorum ungues simili fere morbo afficiantur, qui quoque audit Mauke apud nos, ab illo tamen vehementer discrepat. Nuperrime in Julius u. Gerson's Magazin für ausl. Literatur 1828. Jun. pag. 673. (ex Calcutta Gouvernement Gazette 1827, 6. Aug.) nuntius datur, medicos vaccis inseruisse pus variblosum, eoque produxisse vacciolam; cujus lympham paucis insitam, vacciolam iterum provocasse regularem, contra variolas tutoriam.

bus illis possit imponi; videtur mihi quaestio illa pro meletemate medicorum cautorum et verum amantium ingenio curaeque quam maxime tradenda et commendanda. Nondum enim, (quae Jennerus*) ad derivandam vacciolam ex equorum morbo isto docet, vaccas tempore eodem affligi vacciola, quo equi morbo isto unguium, sancta sunt et recepta; nondum sufficiunt experimenta et a Gasnero**) et a Sacco***) instituta, quorum priori, ut vacciolam evocaret, cum variolae propriae pus inseruisset, contigit; huic, ut materia in unguibus equorum morbo illo affectorum excreta in vaccis vacciolam, eandemque in pueris, in ovibus autem variolas oviles produxerit; neque, quae a Viborg****) observata sunt, succum condylomatatum (des porreaux) equorum in vaccis et hominibus vaccio-

*) *Jenner Sendschreiben an Dr. de Carro den 27. Novbr. 1799; u. de Carro Beobachtung und Erfahrung über die Impfung der Kuhpocken; n. d. Französischen von Dr. v. Notenschlag, Wien 1801, p. 31.*

Cf. Jenners Sendschreiben an Dr. de Carro den 23ten Jan. 1801.

**) *Gasner in der Salzburger mediz. chir. Zeitung 1827. No. 67.*

***) *Sacco, l. c. p. 129 - 155. Dr. v. Olfers d. vegetativis et animatis corporib. in corporib. animat. reperiundis commentarius. Berol. 1816. p. 19.*

****) *Viborg Analyse de travaux de la société royale vétérinaire de Copenhague; II Rapport. Copenh. 1815.*

lam procreasse, vidit; nondum quidem sufficiunt, at satis tamen jam valent, atque parum fere abest, ut omnium sibi rapiant medicorum animos, quare ullo jure vituperandi neutiquam videntur illi, qui inclinantur ad sententiam, omnem tutelam a vacciola contra variolam exhibitam derivandam esse ex illo communi ortu. Ita Dr. v. Olfers sentit, qui omnes variolosas eruptiones in organismis animalibus observatas uti species generis unius comprehendit; et Krause*), cujus consilium in libro edendo hoc potissimum fuit, ut variolam et vacciolam unam esse eandemque, pro veri simillimo demonstraret; et Kieser, qui contendit, posse omnia viva, organismo certe simili instructa, iisdem morborum seminiis affici; hos tamen secundum organorum discrimina et rationem diverse conformari; ita variolam hominum ostendere in vaccis vacciolam, paronychiam erysipelatosam in equis, variolas oviles in ovibus etc.

Innotuit mihi locus, qui etiam ad hanc sententiam confirmandam faciat, e Marii Aventicensis episcopi Chronico**), qui dicit:

*) Krause, l. c. praefat. p. VII, et p. 228 - 234. et 483 ff.

**) Marii Aventicensis Chronicon (in historiae Francorum scriptoribus Tom. I. Lutet. Paris. 1646. p. 215.) cf. Schnurrers *Chronik der Seuchen I*, p. 138. Ille quoque verba facit de epidemia annos 1569. grassante et animalia bubula afficiente. cf. quoque Sachsae de originibus variolar. Regiomont. 1824. p. 5.

„hoc anno (anno IV. Cons. Iustini Jun. Aug. Ind. „III.) morbus validus cum profluvio ventris et variola, Italiam Galliamque valde afflixit; et animalia bubula per loca supra scripta maxime interierunt.“

Sine ulla dubitatione multum ad sententiam fovendam maxima valet vacciolae cum variola similitudo quoad formam, structuram et decursum; qua Turner jam, de Carro, Hoffmann, Struve et Wedekind moti sunt, ut vacciolam cum variola unam eandemque esse augurarentur.

Adversari fortasse videtur, quod variolae semine una solummodo pustula crescit. At enim vero contagium accepit hoc signum characteristicum e vaccarum uberibus, quae, sola ex harum artubus cute teneriore insitionique lymphae favente exstructa, sola exanthema possunt pustulosum protrudere ita conformatum, uti contagii specifica vi et facultate expostulatur. Manet etiam signum hoc contagio ad homines iterum transportato ob fixiorem, quem nactum est, characterem, atque una ob methodum, qua transportaturi utimur. Si variola concoqueret in vaccis ita volatile contagium suum, uti in hominibus solet, tunc haud dubie per alias quoque vias, internas magis, intraret organismum; pluresque provocaret pustulas; quo magis enim ad

*Jahrbuch der Staatsarzneykunde v. Kopp:
Jahrg. II. Frankf. a. M. 1809. p. 520. G. P. Mo-
gallö über die Pocken der Schaafe etc. Bresl. 1815;
p. 10.*

interna organa pertinet illud, quibus recipitur contagium, eo vehementius reagit organismus, eo intensior febris et copiosior pustularum eruptio. Ita recordor, puero cuidam, in quo pluries inserendi ratione regulari frustra vacciolae exanthema expectabatur, crustas vacciolae in pulverem redactas, ut deglutiret, traditas, indeque febrem vehementissimam cum exanthemate copioso exortam esse.

Illis igitur circumspectis hoc veri simillimum mihi videtur: dubium quidem adhuc esse nondumque explicitum, cognatae an sint variola et vacciola, jure tamen posse dici agnatas, affinesque.

Ad maximam enim similitudinem externam accedit hoc quoque, quod viae et rationes contagii utriusque, nervos et vasa adeundi organismumque, qui propaget ipsa, cogendi, simillimae etiam sint. Ita fit, ut contagium variolosum, corpus vacciolam passum infecturum, inveniat organismum ita transmutatum tamque male sibi faventem, ac si ipsum prius jam adfuerit, et praedispositionem communem sustulerit.

Talis affinitas non impedit, quominus vacciola et variola, quarum contagia uno eodemque tempore corpori insita sunt, suum quaeque percurrat cursum, eoque absoluto terminum peculiarem attingat; quale observatum a Woodville*),

*) *Willian Woodville Beschreibung einer Reihe von Kuhpockenimpfungen. Uebers. von Friese. Brest. 1800, p. 122.*

Sacco*), Willan**) aliisque obstat demonstraturis, plane eadem esse morborum semina; neque minus intelligitur quoque, quomodo, illud si fit, non raro altera ab altera characteristica quaedam arripiat sibi, quod in illis experimentis observatum quoque refertur.

Nulla certe modo equidem consentire possim cum Montgerat***), neque cum Lüders, qui hujus sententiam amplexus iterum est: esse variolam considerandam uti variolae, utpote virus antidoton. Tali explicandi ratione res non perspicua, sed obscurior reddi mihi videtur; atque verum esse intelligitur, quod Schelver****) jam monet: „tutelam vacciolae contra variolam explicatu-
„permale, quomodo res ipsorum agatur, intellige-
„re, si variolam atque vacciolam re vera differre
„dicitent.“

Absolvisse nunc nobis videmur hoc capite disquisitionem de causis atque momentis, quibus fieri possit, ut vacciola, quae ubi regulariter in cor-

*) Sacco l. c. p. 46.

**) Willan Ueber Kuhpockenimpfung. Uebersetzt mit Zus. Götting. 1808. cf. Lüders l. c. p. 15. etc. et p. 99.

***) Montgerat. De la Vaccine considérée comme antidote de la Petit-verole, avec un tableau de vaccination etc. Paris an 11. (1803.) Lüders l. c. p. 178.

****) Schelver Untersuchungen über die Natur der Menschen- und Kuhblattern. p. 98.

pore superata est, e sua natura et indole impedire revera possit, quominus variolae contagium organismum afficiat, deneget tamen vim suam atque metum excitet, ne spes illa, fore ut variolae propriae penitus quondam fugentur terra, fallax sit et cassa. At vero, quoniam momenta illa talia non sunt, quin evitari possint a medicis, horum est, ut omnem illi materiae defoveant operam. Liceat igitur tirocinio meo, paucis tantum, capite tamen singulari conceptis, attentos facere aris nostrae cultores in rationem, qua debeat et possit vacciolae insitioni gloria, nobis et posteris sancta stabiliri.

CAPUT III.

THERAPIA.

§. 1.

Cura morbi ipsius ut plurimum ab arte medica penitus non est exhibenda; quoniam tam mitis est ejus character, tamque certus, quo morbus incedit, trames, ut raro natura ducem vel erroris correctorem postulet. Fuit adeo morbi levitas non paucis medicis practicis pro impedimento, quominus accuratius et anxie in morbi, qui ut tolleretur, non formulam, non medicamen desiderabat, inquirerent naturam. At vero non tam certo regula haec valet, quin possit contrarium observari; interdum est potius medicorum practicorum quisque admonendus, ut huic quoque morbo diligentiam suam non detrahat plane; praecipue primis in stadiis. Hoc tempore naturae procellose contagium evoluturae frena nonnunquam sunt danda; idque locum habet potissimum in angina illa, cui ut apparatus antiphlogisticus opponeretur totus,

F

necesse fuisse saepe saepius vidi. Praeterea autem pluribus in casibus, et quidem paulo vehementioribus illa mihi sese commendavit methodus sub finem stadii crustae, quae admodum a Vogelio aliisque in variolis laudatur, exhibendi medicinam leniter laxantem, qua a cute derivetur actio nimis vivida in tractum intestinalem; atque quominus furunculi fortasse oriantur aliaque ejusmodi, perbene impediatur.

§. 2.

At multo majore etiam opus est diligentia, omnesque nervi intendendi sunt in curam, ne in homine vacciolam passo unquam oriatur variolois. Quod ut efficiatur, non plane facile confiteor videri opus, de quo tamen, si modo medici et respublica ita sibi sumunt et commendant rem, uti hujus pretium et gloria expostulat, non desperandum erit. Priora igitur, quae de hac re, e pectore, ejusque desiderio illam hominum societati prae-bendi salutem, quam medicina praebere potest et vult, prodeuntia, tradere conor, pertinebunt ad medicos.

§. 3.

Nolo equidem longus esse in demonstrando et adprecando: maxima et anxia fere diligentia atque indefesso studio exerceatis lymphae vaccinicae insitionem. Experti estis ipsi, et tam multae summorum virorum voces dictitant, insitionem vacciolae nonni-

si regulariter superatae veram et perfectam praebere a variolis crudelibus illis tutelam. Multi fortasse olim lympham vaccinicam imbuti sunt a medico, qui postea non porro observavit puerum, contentus nuntio a parentibus exhibito, lympham radices posuisse et ostendisse effectum. Sane ostendit effectum, at non vacciolam regularem et perfecte excultam, sed vaccinellam, quae variolae apte et fortiter resistere non valet. Quare nunc omnibus coram di erit medicorum, vacciolas, quas lymphae insitione provocarunt, revidere accurate semel certe, octavo vel nono die, et pluries, quantum fieri potest pro medicorum officiis et itineris, quod faciendum illis est, spatio. Neque taedebit ipsos, iterum atque iterum lympham inserere vaccinica, si primae insitionis fructus non ex omnibus modis responderit exoptationi. Tertia vel quarta vice repetitae insitioni perfecte saepenumero contigit, quod in prima irregulare, neque sufficiens observatum erat. Multi porro medici solebant, vulneribus duobus factis, ex pustularum utraque lympham sumere, eamque aliis iterum pueris inserere; supervidebant scilicet, vacciolam non posse perfecte organismum intrare, et transformare, uti necesse est, nisi una certe pustula penitus illaesa et integra cursum suum absolverit. Quare si quis de numero pustularum, necessario per se, quaerat, non idem mihi, quod aliis videtur, postulandas esse plures pustulas, quam duas, ut eo fortior organismi affectio et immutatio inde redundet; non

possum potius, quin, experientia medicorum plurimum et patris mei ductus, consentiam cum Sacco (l. c. p. 37) unam adeo sufficere vacciolam, ut perfecta reddatur tutela. At quodcumque quis lympham desumere velit, tunc sane plura sunt instituenda vulnuscula, ut plures inde proveniant vacciolae, aliaeque integrae manere possint. Praeterea autem securius equidem putaverim et aptius, per plura et plerumque per sex vulnuscula immitti lympham, ut, si casu fortasse infausto in uno alterove brachio lymphae vis deleatur, alterae tamen incisiones effectum exoptatum dare possint.

§. 4.

Altera porro exorta mihi est quaestio, annon melius ageretur a medicis, si paulo proveciore aetate lympham insererent vacciolae. Meas de hacce recogitationes medicorum iudicio exposui expertorum et doctissimorum; quae si pluribus fortasse verisimile aliquid habere videantur, regulam component: ne quis vacciolam inserat pueris, annum tantummodo vel mensem adeo agentibus; potius expectetur annus vitae secundus certe, vel tertius. Quod tamen ita non intelligatur, ut, si fortasse periculum aliquando instet, ne infans variolis afficiatur, non liceat medico, periculum remove; potius officium sane sanctum tunc redundat medico, infantibus omnibus vacciola insita tradere tutelam; memoriae vero commendetur, tales non penitus et semper esse securos, sed post aliquod

tempus iterum esse insitioni subjiaciendos; ut ipsis etiam totum evadat tutamen. Idem valet de scrophulosis quoque pueris. Studuisse certe videmur, ut demonstremus, quomodo scrophulosus, vacciolae insitioni subjectus, non per totam vitam securus esse possit et tutus a variolosi contagii infectione. Audio equidem quaerentes: igitur scrophulosi lymphæ vaccinica plane non sunt imbuendi? quibus vero responderi voluerim, me neutiquam medicos velle privare remedio tam insigniter scrophulosi adversante, eamque compescente; qua laude ex medicorum doctissimorum et celeberrimorum assertis vacciola revera digna esse videtur; at idem in illis est agendum, quod in pueris, nimis teneram agentibus aetatem, et tamen ob periculi praesentiam necessario imbuendis; pubertatis stadio peracto et scrophulosi vel plane deleta, vel mitigata tamen, iterum sunt vacciolae insitioni subjiaciendi.

§. 5.

Ut autem hoc ita quoque possit peragi, probabile semper visum est et necessarium: ut medicus primum in suis quidem ipsius schedis denotet pueri, cui inseruit lympham, et aetatem et valetudinem et effectum, qui observatus sit; deinde autem parentibus quoque vel cognatis talem porrigat schedulam; in qua eadem legantur scripta, nota adjecta, an ex medici sententia iterum aliquando vacciola inseren-

da sit annon. Tales schedulae probe sunt servandae, (ad schedas baptisterias fortasse appositae), atque certis periodis revidendae; prima nimirum, quando pueri scholis publicis traduntur, ut illi possint iterum lympha imbui, quorum aetas, qua passi sunt vacciolam, pari minor et tenerior fuit; secunda autem, ubi adolescentes ministerio alicui vel arti, vel litteris sese tradere volunt; ut nunc illi quoque, qui antea scrophulosi et nunc fortasse penitus jam validi a recente tutelam illam praeclaram nanciscantur.

Parentes eruditi, salutemque infantium aliis cunctis praeponentes, amore jam ipsorum ducti, bene et lubenter illud curabunt, si modo medicus attentos fecerit illos; at vulgus, quod non raro ut bonum assumat, et judicia stulte ab atavis tradita mittat; cogi fere debet, non tam facili erit opera adducendum; atque intelligo, hocce opus medicis solis jure non posse imponi; est potius hoc primum, quod, ut ad illos me convertam, penes quos est rempublicam conservare, me commoveat.

§. 6.

Macte! Saxonia! Tu quoque nunc ex annis pluribus jam gaudes fortuna, ut magistratus singuli vacciolae insitionem cordi sibi sumant, atque ut ubicunque recte exerceatur, studiose curent.

§. 7.

At tamen nondum eo perfectionis res progressa est, ut nihil amplius sit desiderandum, nihilve corrigendum. Nondum id curatum est, ut videatur, ne quis, vacciolam nonnisi passus, ad scholam publicam, cursuque scholastico superato, ad ministerium aliquod vel ad litteras tractandas admittatur; quod tamen necessario expostulatur, ut in pago aliquo, urbe, regione tota non exstet quis, qui vacciolam non passus sit. Hac tantummodo ratione potest impetrari, ut ob variolas, ab alia fortasse terra invectas, epidemiae variolosae erupturae metus excitari plane non possit; ita tantummodo spes potest foveri, fore, ut variolam quondam homines non porro visuri sint.

Vera haec esse, neque ut nugas abjicienda, experientia docuit, hac ipsa per Saxoniā grassante epidemia, quae illis in regionibus, in quibus vacciolae insitioni parum diligenter et studiose incum̃i solebat, effrenem interdum nec non lethalem nacta est vim; dum ubi pauci vacciolam non passi exstabant, mox mitigari poterat, eoque facilius, quo citius pauci illi, vacciola insita, defendi poterant a variola.

§. 8.

Altera tamen porro exstat via, qua medicis multo facilior et suavior reddi possit vacciolam inserendi opera, et securius impetrari, ut vacciolae

insitio ita fiat communis, accipiatque gloriam omnibus ita laudatam et sanctam quasi, uti optandum est et postulandum. Non enim adhuc ita obstant iudicia a hominibus plebejis praesumta, quam necessitas obolum dandi medico, qui aliquid certe habeat pro tempore et diligentia, quam rei, interdum sane molestae et bilem commoventi, tradere debet.

Dices, magistratum esse lege adstrictum, ut solvat pro pauperibus; sane quidem, at longe maxima est talium pauperum copia, qui opera quidem, unde lucrentur aliquid, tractent sua; vix tamen ac ne vix quidem inde redundat, quo ipsi et uxores cum infantibus possint vivere; hi stomachantur cum medico, vacciolam insituro, atque millia, cur infaus lymphæ vaccinica non possit imbuï, simulant argumenta; debilem enim esse puerum, atque exstare metum ne afficiatur nimis, vel catarrhum vexare pusillum, vel dentes esse proveniuros, ejusque modi alia permulta; veram autem, quo minus edicant causam, impedit pudor; nam non habent, quam medico solvant pecuniam.

At enim vero sunt quidem medici, qui bonitatem rei ita venerentur et aestiment, ut conscientia, sese hominibus profuisse, dum certum eorum orco rapuerint, contenti sint, nihilque praeterea quaerant. Sunt tamen alii etiam, qui aspernentur rem, otium et operam sibi erripientem et molestam, de qua tamen, quod ex aliqua ratione remuneretur, nihil eveniat.

Quanto studiosius, quanto diligentius hi agent provinciam suam, si a republica concedetur, unde remuneratio istis fiat! Quanto alacrius vulgus ipsum tunc custodiet, ne pueri subtrahantur insitioni; quoniam non anxie porro huicce erit quaerendum, unde sumant, quod solvant medico!

Eo minus autem quidem hoc votum reticere volui, quo melior mihi data est occasio intelligendi, quid sit adhuc desiderandum in publica pro vacciolae insitione cura, cum sub patris mei oculis per menses modo praeterlapsos vacciolam in pagis pluribus Varisciae inserendi opus suscepim mihi.

Itaque me absolvisse putaverim materiam meam, in qua pertractanda, si fortasse interdum plura ita dixisse possim videri, quae et quomodo tiro-nem non deceant, excusandum me esse speraverim, quoniam re vera aliam non novi causam, neque adhortationem, nisi ut vires meas tenues etiam rei-publicae, humanitatis, et doctrinae saluti addicam et defoveam.

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930


1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

h. 1. 12



COUNTWAY LIBRARY



HC 2A6A E

Rare Books

t. 2202

Addamenta quaedam ad varioloi1829

Countway Library

BFQ0494



3 2044 046 334 686



COUNTWAY LIBRARY



HC 2A6A E

Rare Books

t. 2202

Addamenta quaedam ad varioloi1829

Countway Library

BFQ0494



3 2044 046 334 686

U. HOLZER
BINDER
BOSTON MASS



COUNTWAY LIBRARY



HC 2A6A E

Rare Books

t. 2202

Addamenta quaedam ad varioloi1829

Countway Library

BFQ0494



3 2044 046 334 686

U. HOLZER
BINDER
BOSTON, MASS.

